

# ACROBAT® WG

dimetomorf + mankozeb - Vannløselig granulater

**Systemisk og kontaktvirkende middel mot tørråte i potet.**

## SAMMENSETNING:

Dimetomorf .....	90 g/kg
Mankozeb .....	600 g/kg
Fyllstoffer .....	310 g/kg



**GIFTIG**

## ADVARSEL

Kan forårsake kreft.

Kan gi fosterskader.

Fare for allergi ved hudkontakt.

Unngå innånding av sprøytetåke

**OPPBEVARES INNELÅST OG**

**UTILGJENGELIG FOR BARN.**

**MEGET GIFTIG FOR VANNLEVENDE**

**ORGANISMER - må ikke nyttes nær-**  
**mere åpent vann enn 10 meter.**

**Bruk egnet verneutstyr**

(se forsiktighetsregler).

**Uskadeliggjør tomemballasjen**

(se avfallshåndtering).

**BEHANDLINGSFRIST: 14 DAGER**

**Avgiftsklasse: 3**

Tilvirker:

**BASF**

BASF Aktiengesellschaft  
D-67056 Ludwigshafen  
Tyskland

Importør:

BASF AS  
Leangbukta 40  
Postboks 233  
NO-1372 Asker  
Tel. 66 79 21 00

Reg.nr. 2000.158

Nettoinnhold: **5 kg**

© Registrert  
varemerke  
for BASF AG  
Tyskland

**Det er forbudt å bruke ACROBAT WG i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

### **BRUKSOMRÅDE**

ACROBAT WG er tillatt brukt mot tørråte i potet. Maksimalt 2 behandlinger i vekstsesongen.

### **BEHANDLINGSFRIST**

ACROBAT WG må ikke brukes senere enn 14 dager før høsting.

### **VIRKEMÅTE**

ACROBAT WG er et soppmiddel med effektiv virkning mot tørråte (Phytophthora infestans) i poteter. ACROBAT WG inneholder to virksomme stoffer, dimetomorf og mankozeb. Dimetomorf er et systemisk soppmiddel som har lokalsystemisk aktivitet ved sprøyting på bladverk og stengler. Dimetomorf har meget god forebyggende og antisporende og kurativ effekt mot tørråte, og er aktiv på flere stadier i soppens livssyklus. Dimetomorf har dessuten effekt mot tørråtesopp, som er resistent mot metalaksyl/oksadiksyd.

Mankozeb er et kontaktvirkende og forebyggende soppmiddel. Det hindrer tørråtesoppen i å utvikle seg på de plantedelene sprøytebelegg finnes. Mankozeb og dimetomorf gir god samvirkning.

ACROBAT WG er formulert som et vannløselig granulatum som gjør produktet lett å håndtere.

### **BRUKSRETTLEDNING**

#### **Dosering**

Bruk 200 g pr. dekar. Anbefalt væskemengde er 20-40 liter vann pr. dekar. Det er meget viktig å få en god dekning av sprøytevæsken på bladverk og stengler. Aktuelt arbeidstrykk på åkersprøyte er 3-5 bar. Minste vannmengde og laveste trykk ved lite bladmasse.

#### **Sprøytetidspunkt**

ACROBAT WG skal sprøytes forebyggende for å gi maksimal effekt mot tørråte. Første sprøyting bør foretas når potetriset er 25-30 cm høyt (like før radene lukker seg), eller ved risiko for angrep. ACROBAT WG skal sprøytes maksimalt 2 ganger med 10-14 dagers sprøyteintervall, avhengig av smittepress, sort og klimatiske forhold. Kortere intervall anbefales ved kraftig nytilvekst, mottakelig sort eller ved økt risiko for angrep, f.eks. under varme og fuktige værforhold. Det bør være 4-6 timer uten nedbør etter sprøyting, slik at preparatet tørker inn på potetbladene. ACROBAT WG kan brukes alene i sprøyteprogrammet eller sammen med andre midler. ACROBAT WG skal ikke brukes på etablerte angrep.

#### **Tillaging av sprøytevæske og blandbarhet**

ACROBAT WG tilsettes når tanken er halvfull med vann. Fyll deretter opp tanken under omrøring. Fortsett omrøring under transport og sprøyting. ACROBAT WG er blandbart med Fastac, Karate, Sumi-Alpha og Pirimor samt Phosyns mikronæ-

ringsemner Magtrel 200 og Mantrac. Ved blanding skal blandingspartneren tilsettes til sist, når ACROBAT WG er fullstendig oppløst i sprøytevæsken. Sprøyt straks etter tillaging av sprøytevæsken. For ytterligere informasjon kontakt din leverandør.

### **FORSIKTIGHETSREGLER**

Bruk egnede vernehansker, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet.

Bruk halvmaske med kombinasjonsfilter A2/P2 S og L ved tillaging av sprøytevæske og ved sprøyting.

Søl av preparatet på huden eller i øynene må straks vaskes eller skylles av.

Ved søl av preparatet skal tøyet byttes.

Overtrekksdress skal destrueres etter bruk.

Foreta kroppsvask etter at arbeidet er ferdig.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Det er forbudt å gå inn i behandlet område eller håndtere behandlede plantedeler etc. uten tilstrekkelig verneutstyr som beskytter hud og øyne i 48 timer etter behandling.

### **RENGJØRING**

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

### **AVFALLSHÅNDTERING**

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

### **LAGRING**

Lagres tørt og kjølig i lukket originalemballasje.

### **MERK**

Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets virkning, spesielt steds- eller regionsbetingede faktorer. Herunder hører for eksempel vær- og jordforhold, kulturplantesorter, vekselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre produkter, forekomst av resistente organismer, sprøyteteknikk og så videre. Ved spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i produktets virkning eller at det kan oppstå skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.

Produksjonsår: 2001

# ACROBAT<sup>®</sup> WG