



Rovral® 75 WG

Iprodion

Vannløselig Granulat

Mot sopp sykdommer i jordbær, bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, kirsebær, plommer, eple, pære, korsblomstra vekster, løk, gulrot, persille, dill, frilandsagurk, salat, sikori-arter, endivie, ert, bønne, bete, veksthusgrønnsaker, prydplanter, plen og skogplanteskoler. Behandling kun under oppal i stang-selleri, sellerirot og purre.

Beising mot sopp sykdommer i potet, korsblomstra jord- og hagebruksvekster, erter, løkvekster og frø til skogplanter.

Sammensetning:

Iprodion	750 g/kg
Fyllstoff	250 g/kg



HELSESKADELIG

ADVARSEL

Irriterer øynene

Mulig fare for kreft

Unngå kontakt med øynene

Unngå innånding av sprøytetåke

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn

Meget giftig for vannlevende organismer - må ikke

nyttes nærmere vannførende grøfter, bekker, samt

dammer og større vannforekomster enn 10 meter

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)

Uskadeliggjør tomemballasje (se forsiktighetsregler)

Avgiftsklasse 3

Behandlingsfrist:

Agurk, tomat: 4 dager

Salat i veksthus (1.10.-1.4.): 28 dager, ellers i året 14 dager

Solbær: 21 dager

Andre spiselige kulturer: 14 dager

Importør:

Aventis CropScience Nordic AS

Postboks 43 • N-3165 Tjøme • Tlf. 33 39 04 04

Tilvirker:

Aventis CropScience SA,

Lyon, Frankrike

Reg. nr. 2000.45

Nettoinnhold: 1 kg

BRUKSOMRÅDE

Rovral 75 WG er tillatt brukt mot sopp sykdommer i jordbær, bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, kirsebær, plommer, eple, pære, korsblomstra vekster, løk, gulrot, persille, dill, frilandsagurk, salat, sikori-arter, endivie, ert, bønne, bete, vekstusgrønnsaker, pryddplanter, plen og skogplanteskoler. Behandling kun under oppal i stangselleri, sellerirot og purre. Beising mot sopp sykdommer i potet, korsblomstra jord- og hagebruksvekster, ert, løkvekster og fro til skogplanter.

Behandlingsfrist:

Agurk, tomat: 4 dager

Salat i veksthus (1.10.-1.4.): 28 dager

Salat i veksthus (1.4.-1.10.): 14 dager

Solbær: 21 dager

Andre spiselige kulturer: 14 dager

VIRKEOMRÅDE

Mot vanlig gråskimmel, løkgråskimmel, løkbladgråskimmel, purregråskimmel, løkhvitratesopp, storknolla råtesopp, begerråte-sopp, gul og grå monilia, heggfleksopp, kirsebærskunvsopp, Alternaria-arter, (skulpesopp, purpulfleksopp m.fl.), svartskunvsopp, kålrot-torråtesopp, klossopp, snømuggsopp, kloverråtesopp m.m.

VIRKEMÅTE

Rovral 75 WG er et kontaktpåvirkende soppmiddel som ved forebyggende behandling har meget god effekt mot en rekke forskjellige sopp sykdommer. Mot enkelte sopp sykdommer som f. eks. Alternaria-arter vil Rovral 75 WG også ha en viss kurativ effekt.

BRUKSRETTLING

*Det må sørges for en kraftig omro-
ring i tanken før utsprøyting!*

Kepaløk og Sjalottløk

Sprøyting i åkeren mot purpulflekk og gråskimmelarter. Sprøyt fra først i juli og opptil 3 ganger seinere. Bruk 70 - 100 g Rovral 75 WG i 20- 40 l vann pr da.

Væskebehandling langs radene mot løkhvitråte. Bruk inntil 330 g Rovral 75 WG i 500 l vann pr dekar først i juli. Alternativt kan dosen sprøytes ut i mindre væskemengde om kvelden og vannes ned med minst 10 mm påfølgende natt.

Purre

Behandling under oppal mot rotbrann-sopp, puregråskimmel m.fl. Bruk 7 g Rovral 75 WG i 10 l vann.

Korsblomstra vekster

Hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, knutekål, kålrot, kinakål og nepe.

Behandling under oppal. Mot rotbrann-sopp (svartskurv), gråskimmel og frøoverførte sopp sykdommer.

A. Rett etter såing/prikling: Bruk 3 g i ca

0,5 l vann pr m² oppalingsflate. Belegg på bladene skylles av med rent vann.

B. Senere behandling under oppalet: Bruk 5 - 7 g i 10 l vann. For ømtålige planteslag som kinakål bør laveste dosering benyttes. Sprøyt ikke i solskinn.

C. Rett for utplantning mot rotbrann (svartskurv) i åkeren: Bruk 100 g i 10 l vann og tilfør 2 l væske pr m² på torvblokkplanter, og 1 liter væske pr m² på pluggplanter. Skyll plantene med rent vann.

Sprøyting i åkeren. Mot skulpesopp og kålrotorråte-sopp: Sprøyt med 70- 100 g i 20- 40 l vann pr da ved begynnende angrep og gjenta behandlingen etter behov. Forebyggende sprøyting mot gråskimmel på hodekål og kinakål på lager: Bruk 70- 100 g i 20- 40 l vann pr da 14- 18 dager før høsting. I ømtålige kulturer som kinakål bør det ikke brukes mer enn 50 g i 100 l vann pr da. Sprøyt ikke i solskinn.

Sprøyting i oljevekster. Mot storknolla råtesopp og gråskimmel. Sprøyt under blomstring ved fare for angrep. Mot skulpesopp sprøyt ved begynnende angrep. Bruk 50 - 100 g Rovral 75 WG i 20- 40 l vann pr da.

Gulrot

Mot Alternaria-bladflekk, klossopp, gråskimmel og storknolla råtesopp. Sprøyt første gang ca 15. juli - 1. august og gjenta behandlingen etter behov inntil 3 - 4 ganger. Bruk 100 g Rovral 75 WG i 40 l vann pr da.

Bønner og ert

Mot gråskimmel og storknolla råtesopp. Sprøyt ved begynnende blomstring og ca 7 dager senere. Bruk 100 g Rovral 75 WG i 20- 40 l vann pr da.

Selleri

Behandling under oppal. Mot frøoverførte sykdommer, rotbrann, gråskimmel, m.fl. Bruk 7 g Rovral 75 WG pr 10 l vann.

Persille og dill

Behandling under oppal. Mot frøoverførte sykdommer, rotbrann, gråskimmel, m.fl. Bruk 7 g Rovral 75 WG i 10 l vann.

Sprøyting i åkeren. Mot gråskimmel og storknolla råtesopp ved begynnende angrep. Bruk 100 g Rovral 75 WG i 20- 40 l vann pr da. Rotpersille som skal drives sprøytes siste gang 14 - 18 dager før opptak.



5705628405422

Filandsagurk

Behandling under oppal. Mot frooverførte sykdommer, rotbrann, gråskimmel m.fl. Bruk 5 - 7 g Rovral 75 WG i 10 l vann.
Sprøyting i åkeren. Mot agurkbladflekk, gråskimmel og storknolla råtesopp. Sprøyt fra plantene legger seg med 10 - 14 dagers intervall. Bruk 70 g Rovral WG i 20- 40 l vann pr da. Sprøyt ikke i solsokinn.

Bete

Behandling under oppal. Mot visse rotbrannssopper (svartskurv m.fl.) gråskimmel og frooverførte soppsykdommer.

A. Rett etter såing/priking:

Bruk 3 g Rovral 75 WG i ca 0,5 l vann pr. m² oppalingsflate. Belegg på bladene skylles av med rent vann.

B. Senere behandling under oppalet:

Bruk 7 g Rovral 75 WG i 10 l vann. Sprøyt ikke i solsokinn.

Salat, sikori-arter, endivie

Behandling under oppal. Mot frooverførte sykdommer som rotbrann, gråskimmel m.fl. Bruk 5 g Rovral 75 WG i 10 l vann.

Sprøyting i åkeren. Mot gråskimmel, storknolla råtesopp og svartskurv. Sprøyt etter rotfesting og gjenta behandlingen 1-2 ganger med 3 - 10 dagers intervall. Mot klossopp. Sprøyt ved begynnende angrep. Bruk 50 g Rovral 75 WG i 20- 40 l vann pr da. Sprøyt ikke i solsokinn.

Veksthusgrønnsaker

Tomat, agurk, melon, paprika, kinakål, dill, salat.

Behandling under oppal. Mot frooverførte sykdommer, rotbrann, gråskimmel m.fl. Bruk 5 g Rovral 75 WG i 10 l vann.

Sprøyting etter planting. Mot gråskimmel, storknolla råtesopp m.fl. I tomat, agurk, melon og paprika sprøytes det mot gråskimmel ved begynnende angrep, og om nødvendig gjentas behandlingen med 14 dagers intervall. Salat sprøytes mot gråskimmel ikke etter planting og eventuelt 1- 2 ganger senere. Bruk 50- 70 g Rovral 75 WG i 100 l vann. For omåtlige vekster som kinakål og salat bør det ikke brukes mer enn 50 g Rovral 75 WG i 100 l vann. Sprøyt ikke i solsokinn.

Frukt og bær

Eple. Mot gul- og grå monilia og begeråte. Sprøyt ved begynnende blomstring og gjenta behandlingen 10- 14 dager senere. Bruk 100 g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Plomme. Mot gul monilia. Sprøyt ca 14 da-

ger etter avblomstring og 1-2 ganger senere etter behov. Bruk 100g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Kirsebær. Mot grå monilia. Sprøyt 1- 2 ganger under blomstring. Mot gråskimmel, heggflekk og kirsebærskurv. Sprøyt like etter avblomstring og eventuelt 2 ganger til med 10 - 20 dagers intervall. Bruk 100 g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Jordbær på friland og bringebær. Mot gråskimmel. Sprøyt ved begynnende blomstring og gjenta behandlingen 2-3 ganger senere med 5- 7 dagers intervall. Bruk 70- 100 g Rovral 75 WG pr 100 l vann og minst 100 l væske pr da eller pr. 1000 m rad.

Jordbær i veksthus. Mot gråskimmel. Sprøyt ved begynnende blomstring og gjenta behandlingen 2- 3 ganger med 5 dagers intervall. Bruk 70 g Rovral 75 WG i 60- 100 l vann pr 1000 m rad.

Solbær, stikkelsbær og rips. Mot gråskimmel. Behandles under hele blomstringsperioden inntil 4 ganger med 5 dagers intervall. Bruk 70 g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Prydplanter

Mot gråskimmel i Azalea, (Rhododendron simsi), Chrysanthemum, Cyclamen, Kalanchoe, Pelargonium, julestjerne (Euphorbia pulcherrima), Senecio og Sinningia. Sprøyt ved begynnende angrep og eventuelt med ca 14 dagers intervall. Bruk 70 g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Rovral 75 WG virker også mot Altenaria på Dianthus. Sprøyt ikke i solsokinn. Unngå sprøyting på prydplanter under blomstring.

Pleier og grasbær

Mot overvintringssopper. Sprøyting utføres seinhøsten, vanligvis i begynnelsen av oktober. Bruk 170 g Rovral 75 WG i 20- 40 l vann pr da. På områder hvor det erfaringsmessig er problemer med fusarium (snømugg) kan doseringen økes til 330 g Rovral 75 WG pr da.

Mot bladflekkopper m.fl. Sprøyt i vekstsesongen ved begynnende angrep. Bruk 100 g Rovral 75 WG i 20- 40 l vann pr da.

Skogplanteskoler

Mot svartskurv, rotfittsopp m.fl. (Rhizoctonia-arter), Phoma-råte og gråskimmel. Sprøyt ved begynnende angrep. Behandlingen gjentas etter behov med ca 14 dagers intervall.

Sprøyting. Bruk 100 g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Frobeising: Bruk 5 g Rovral 75 WG pr kg fro i blandingsforhold 4 deler Rovral 75 WG til 1 del vann. Behandles tidligst mulig etter froanking.

Beising av settepoteter

Mot svartskurv ved setting.
Dypning i 1,0% oppløsning (1000 g Rovral 75 WG til 100l) for setting. Potetene skal være tørre for settingen starter.

Behandling i grokasser med 270 g Rovral 75 WG med inntil 40 l vann pr tonn settepotet. Bruk ryggspørte el. lignende.

Behandling ved setting med sprøytestyr påmontert settemaskinen. En eller to dyser plasseres ved hvert skjær slik at poteten faller gjennom en sprøytåke, og dermed dekkes av Rovral 75 WG. Bruk 200 g Rovral 75 WG med inntil 40 l vann pr tonn settepotet.

Beising av fro og settelek

Korsblomstra vekster. Mot skulpe-sopp, kålot-torråte og gråskimmel. Korsblomstra jordbruksvekster (oljefro): Bruk 270 g Rovral 75 WG pr 100 kg fro. Korsblomstra grønnsaksvekster: Bruk 400 g Rovral 75 WG pr 100 kg fro.

Erter. Mot ertelekk, ertefotsyke og rotbrann. Bruk 130 g Rovral 75 WG pr 100 kg fro.

Løkkevekster. Våtbeis og konsentrarbeis av settelek mot løkbladgråskimmel, purpurflekk og løkhvitåte.

Våtbeis. Dyp loken i en oppløsning av 200 g Rovral 75 WG pr 100 l vann. Mot løkhvitåte økes doseringen til 670 g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Konsentrarbeising gjennom dyser: Bruk 30 g Rovral 75 WG i 2- 10 l vann pr da. Mot løkhvitåte økes doseringen til 100 g Rovral 75 WG pr da.

Løkfro. Mot løkgråskimmel, løkbladgråskimmel og purpurflekk. Bruk 530 g Rovral 75 WG pr 100 kg fro.

KLIMAEETS PÅVIRKNING

Klimaet har ingen direkte påvirkning for effekten av Rovral 75 WG, men høy temperatur og luftfuktighet øker de fleste soppenes infeksjonstrykk og dermed økende behov for behandling. Rovral 75 WG's effekt sees som friske planter.

TILLAGG AV SPRØYTEVÆSKE

Fyll sprøytetanken med halvparten av den vannmengden som skal brukes. Start omrøring og tilsett den tilmålte mengde Rovral 75 WG. **Det er viktig at granulater røres godt ut i vannet.** Etterfyll med resten av vannmengden.

Ved en eventuell tankblanding med et annet produkt tas blandingspartneren i til slutt.

BLANDING MED ANDRE MIDLER

Rovral 75 WG kan blandes med Bravo 500 og de fleste skadedyrmidler. Rovral 75 WG kan ikke blandes med ammoniumgjødsel

LAGRING

Rovral 75 WG må lagres tørt

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk egnete vernehansker, overtrekksklær og vernehuller/ansiktsskjerm ved tilagging av sprøytevæske og ved langvarig sprøyting. Når det er fare for å puste inn sprøyteåke, må hel- eller halvmaske med kombinasjonsfilter for støv og gass (P2, A1) brukes. Sol av preparatet på hud, øyne eller klær må straks skylles eller vaskes av. Skift og vask arbeidstøyet når arbeidet er avsluttet, og foreta en grundig kroppsvask.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjons-sentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgn).

AVFALLSHÅNDTERING

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tommes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøytestyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettleddningen er basert på forsk og erfaring. Dersom preparatet brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.



© = Reg. varemerke for Aventis CropScience