

# Agil® 100 EC

Bruksrettledningen må følges slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke Agil 100 EC i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren, øyevern, støvler, overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2S og L ved håndtering og bruk av preparatet.

Får man stoffet i øynene, skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjons-sentralen tlf. 22591300.

Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av.

Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjons-sentralen tlf. 22591300.

Overtrekksdrakt, støvler og vernehansker må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 12 timer etter sprøytning.

## LAGRING

Agil® 100 EC oppbevares frostfritt.



® = Reg. varemerke for:  
Quena Plant Protection N.V.  
– Member of the Makhteshim-Agan Group -



MAKHTESHIM  
A G A N  
HOLLAND B. V.

# Agil®

## 100 EC



### UGRASMIDDEL

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord- og hagebruksvekster.

**Formulering** : emulsjon konsentrat

**Sammensetning** : Propakvizafop ..... 100 g/l  
N-metyl-2-pyrrolidon ..... 100 g/l  
Spred- og emulgeringsmidler ..... 400 g/l  
Fyllstoffer ..... 400 g/l

Reg. nr. : 2001.14.03



MILJØSKADELIG



HELSESKADELIG

### ADVARSEL

Farlig ved innånding  
Irriterer øynene og huden  
Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging  
Unngå innånding av sprøytetåke

Unngå kontakt med huden og øynene  
Ved svelging må ikke brekning fremkalles:  
Kontakt lege omgående og vis denne etiketten eller emballasjen  
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn  
Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfalls-håndtering)  
Inneholder propakvizafop. Kan gi allergisk reaksjon.

### BEHANDLINGSFRISTER:

Potet og kålrot, oljevekster og selleri: 8 uker  
Jordbær: 4 uker  
Øvrige vekster: 6 uker

Avgiftsklasse 2

Nettoinnhold: **1 Liter**

**Distributør:**  
Norgesfôr AS  
Torggaten 10  
0181 OSLO  
Norway

**Tilvirker:**  
Quena Plant Protection N.V.  
- Member of the Makhteshim-Agan Group -  
Pos Cabai Office Park, Unit 13  
Willemstad - Curaçao  
Netherlands Antilles

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22591300.

Overtreksdrakt, støvler og vernehansker må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 12 timer etter sprøyting.

### RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen.

Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

### AVFALLSHÅNDTERING

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

### LAGRING

Agil® 100 EC oppbevares frostfritt.

® = Reg. varemerke Quena Plant Protection N.V., Curaçao

### Tilvirker:

Quena Plant Protection N.V.  
- Member of the Makhteshim-Agan Group -  
Pos Cabai Office Park, Unit 13  
Willemstad - Curaçao  
Netherlands Antilles

### Distributør:

Norgesfôr AS  
Torggaten 10  
0181 OSLO  
Norway



REG.NR. 2001.14.03



MAKHTESHIM  
A G A N  
HOLLAND B.V.

# Agil®

## 100 EC



### UGRASMIDDEL

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord- og hagebruksvekster.

**Formulering** : emulsjon konsentrat

**Sammensetning** : Propakvizafop ..... 100 g/l  
N-metyl-2-pyrrolidon ..... 100 g/l  
Spred- og emulgeringsmidler ..... 400 g/l  
Fyllstoffer ..... 400 g/l

Reg. nr. : 2001.14.03



MILJØSKADELIG



HELSESKADELIG

### ADVARSEL

Farlig ved innånding  
Irriterer øynene og huden  
Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging  
Unngå innånding av sprøytetåke  
Unngå kontakt med huden og øynene  
Ved svelging må ikke brekning fremkalles:  
Kontakt lege omgående og vis denne etiketten eller emballasjen  
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn  
Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfalls-håndtering)  
Inneholder propakvizafop. Kan gi allergisk reaksjon.

Avgiftsklasse 2

### BEHANDLINGSFRISTER:

Potet og kårlot, oljevekster og selleri: 8 uker  
Jordbær: 4 uker  
Øvrige vekster: 6 uker

Nettoinnhold: **1Liter**

**Distributør:**  
Norgesfôr AS  
Torggaten 10  
0181 OSLO  
Norway

### Tilvirker:

Quena Plant Protection N.V.  
- Member of the Makhteshim-Agan Group -  
Pos Cabai Office Park, Unit 13  
Willemstad - Curaçao  
Netherlands Antilles

JS068A/01

Bruksrettleddning: Se vedlagte lommeetikett

## BRUKSRETTLEDNING

# Agil® 100 EC

## Propakvizafoep emulsjon

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i tofrøblada jord- og hagebruksvekster.

### Sammensetning:

Propakvizafoep .....	100 g/l
N-metyl-2-pyrrolidon .....	100 g/l
Spred- og emulgeringsmidler .....	400 g/l
Fyllstoffer .....	400 g/l



HELSESKADELIG



MILJØSKADELIG

### ADVARSEL

Farlig ved innånding  
Irriterer øynene og huden  
Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging  
Unngå innånding av sprøytetåke  
Unngå kontakt med huden og øynene  
Ved svelging må ikke brekning fremkalles:  
Kontakt lege omgående og vis denne etiketten eller emballasjen

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn  
Giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfalls-håndtering)  
Inneholder propakvizafoep. Kan gi allergisk reaksjon.

**Bruksrettledningen må følges slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke Agil 100 EC i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

### BRUKSOMRÅDE

Mot kveke, floghavre og andre grasarter i oljevekster, potet, kålrot, förmargkål, hvitkål, blomkål, brokkoli, gulrot, rødbete, kepaløk, purre, knollselleri, stangselleri, jordbær på friland, erter, rødkløver- og rødsvingelfrøeng, karve til frø, bokhvete og lin.

### BEHANDLINGSFRIST

Potet, kålrot, oljevekster og selleri : 8 uker  
Jordbær : 4 uker  
Øvrige vekster : 6 uker

### VIRKEMÅTE

Agil 100 EC virker systemisk og tas opp av grasplantene gjennom bladene. Virkningen inntreer etter 3-5 dager da grasets tilvekst stopper. Første synlige tegn på virkningen er gul/rødfarging av bladene som inntreer etter 10-14 dager. Etter ytterligere 3-8 dager foregår en fullstendig nedvisning av gras. Agil 100 EC stiller ingen spesielle krav til temperatur. Behandling bør dog ikke foretas ved fare for nattefrost. Best effekt oppnås ved relativt høy luftfuktighet (> 70%) og god markfuktighet. For å få fullgod effekt kreves minst en time uten regn etter sprøyting. Under svært tørre forhold kan virkningen reduseres.

### UGRASVIRKNING

Agil 100 EC er et systemisk ugrasmiddel mot kveke, floghavre, knereverumpe, spillkorn, hønsehirse og andre grasarter. Virkningen mot tunrapp er begrenset.

Kultur	Ugras	Dosering pr. daa	Sprøyting
Oljeraps, oljeryps, erter, potet, kålrot, förmargkål, förraps. blomkål, brokkeli, hvitkål, rødbete, rødkløverfrøeng, rødsvingelfrøeng, karve til frø og lin	Kveke	150 ml	Når kveke har 3-5 blad
Gulrot, kepaløk, purre, knollselleri og stangselleri	Kveke	100 ml +100 ml	Når kveke har 3-5 blad På eventuell gjenvekst ca 1 mnd senere.
	Tunrapp	150 ml + 150 ml	Tunrapp 1-3 blad + 3 uker senere
Jordbær på friland	Kveke	150 ml	Når kveke har 3-5 blad, senest før begynnende blomstring. På eventuell gjenvekst straks etter siste høsting.
		+150 ml	
I ovennevnte kulturer og i bokvete	Spillkorn, floghavre knereverumpe, hønsehirse m.fl.	75-100 ml	Når grasugraset har 2-4 blad

Maksimalt antall behandlinger pr. år: Inntil 2 i angitte kulturer ovenfor.

### RENGJØRING AV SPRØYTA

Agil 100 EC kan frigjøre gamle preparatrester i ei dårlig rengjort sprøyte. For å hindre at rester av ugrasmidler forårsaker skade i følsomme kulturer, bør sprøyteutstyret rengjøres med et anbefalt rengjøringsmiddel før og etter sprøyting.

### TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE, BLANDBARHET

Fyll tanken 3/4 med vann. Tilsett Agil 100 EC under god omrøring. Agil 100 EC kan blandes med insektmidler, unntatt dimetoat. Blanding med tørråtemidler eller andre ugrasmidler anbefales ikke da det vil gi redusert ugrasvirkning samtidig som kulturplantene kan ta skade. Det bør være et intervall mellom ugrassprøyting med andre midler på minst 1 uke.

### JORDARBEIDING

Det bør gå minst 1 uke mellom sprøyting med Agil 100 EC og jordarbeiding.

### FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren, øyevern.støvler, overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2S og L ved håndtering og bruk av preparatet. Får man stoffet i øynene, skylt straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonsentralen tlf. 22591300. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av . Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks.