

# SELECT

## Kletodim emulsjonskonsentrat

Mot tunrapp og andre ettårige grasarter, i visse kulturvekster

(Se bruksområde)

### Sammensetning

Kletodim	240 g/liter
Aromatiske løsningsmidler	657 g/liter
Overflateaktive stoffer	29 g/liter



HELSEKADELIG

## ADVARSEL

Farlig ved innånding

Irriterer øynene og huden

Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging

Unngå kontakt med huden og øynene

Unngå innånding av sprøytetåke

Ved svelgning må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege og vis denne etikett eller emballasje

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn

Giftig for vannlevende organismer

Skadelig for nytteedyr

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshandtering)

**BEHANDLINGSFRIST:** Potet, ert, raps, gulrot, kepaløk: 6 uker

Jordbær på friland: Før blomstring.

Frukttrær: Før kartsetting

Bærevkster: Før blomstring og/eller etter høsting

Avgiftsklasse 3

Reg. nr.: 2001.3

Nettoinnhold 3 liter

**Tilvirker:** Tomen Agro Inc. USA

**Nordisk representant:** KVK AGRO A/S,  
Køge, Danmark

Importør:

**Agrovekst**

**Agrovekst Produkter AS**

Huggenes Gård, 1581 Rygge

Tlf. 69 26 99 80

www.agrovekst.no

**Det er forbudt å bruke Select i strid med godkjent bruksområde, behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering.**

## BRUKSOMRÅDE

Select er tillatt brukt i kepaløk, jordbær på friland, gulrot, potet, raps, ert, lin (til teknisk bearbeiding), rødsvingelfrøeng, kløverfrøeng, bærevkster og frukttrær.

## VIRKEMÅTE

Select er et systemisk bladherbicid. Noen dager etter sprøyting stopper veksten i ugraset. Synlige symptomer på virkning er mørkfarging av vekstpunkter og gulning av yngre blad. Eldre blad får etterhvert en orange til rødfiolett fargetone. Fullstendig nedsviing skjer etter 2-5 uker.

## VIRKEOMRÅDE

Select har særlig god virkning mot tunrapp, spillkorn og floghavre, men har i anbefalte doser også virkning mot kveke. På etablert kveke i frukt- og bærhager er kvekevirkningen dårlig. I konkurransesvake kulturer og/eller i kulturer med lang vekstid, kan sprøyting på ny oppspiring eller gjenvest være aktuelt.

## BRUKSRETLEDNING

### Dosering og sprøytetid

Bruksområde	Bekjempningsformål	Dose	Behandlingstidspunkt	Merknad
Kepaløk og gulrot	Tunrapp, floghavre, andre grasugras og spillkorn	1. behandling: 40 - 50 ml Select 2. behandling: 30 - 40 ml Select.	1. behandling når ugraset har 3-5 blad 2. behandling etter behov ved ny spiring av tunrapp	Sådde løkvekster skal ha minimum 1 fullt utviklet blad før behandling. Tilsett like mye Renol som Select i tanken!
Kepaløk, gulrot og potet.	Kveke	75-100 ml Select (evnt. delt i 2 behandlinger á 50 ml Select, med 3 ukers mellomrom)	Behandling når kveka har minst 3 blad. Ved sen behandling (nærmere 5 blad), eller tørkestress velges høyeste dose.	Sådde løkvekster skal ha minimum 1 fullt utviklet blad før behandling. Tilsett like mye Renol som Select i tanken!
Potet	Tunrapp, floghavre, andre grasugras og spillkorn	40-50 ml Select	Behandling når ugraset har 3-5 blad	Tilsett like mye Renol som Select i tanken!
Våroljevækster, lin (til teknisk bearbeiding) og ertler	Kveke (den aktuelle dosen kontrollerer kveka i vekstsesongen, men gir ikke nødvendigvis varig bekjemping)	50 ml Select	Behandling når kveka har minst 3 blad. I raps, rybs og lin må behandling skje før begynnende blomstring. I ert senest på 2-node stadiet.	Tilsett like mye Renol som Select i tanken!

# BRUKSRETLEDNING

## Dosering og sprøytetid

Bruksområde	Bekjempningsformål	Dose	Behandlingstidspunkt	Merknad
Våroljevekster, lin (til teknisk bearbeiding) og erter	Tunrapp, floghavre og andre grasugras	40-50 ml Select	Når grasugraset har 3-5 blad. I raps, rybs og lin må behandling skje før begynnende blomstring. I ert senest på 2-node stadiet.	Tilsett like mye Renol som Select i tanken!
Høstoljevekster	Kveke (den aktuelle dosen kontrollerer kveka i vekstsesongen, men gir ikke nødvendigvis varig bekjemping)	50 ml Select	Om høsten mens det er god vekst i ugraset, eller om våren før begynnende strekningsvekst. Høstbehandling må skje innen 20. september.	Tilsett like mye Renol som Select i tanken!
	Tunrapp, floghavre og andre grasugras	40-50 ml Select	Om høsten mens det er god vekst i ugraset, eller om våren før begynnende blomstring	
Jordbær på friland	Tunrapp i produksjonsfelt	40-50 ml Select	Om våren når tunrappen er i vekst fram til blomsterstenglene begynner å strekke seg, og /eller etter høsting.	Tilsett like mye Renol som Select i tanken
	Tunrapp i etableringsåret	1. behandling: 40 - 50 ml Select 2. behandling: 30 - 40 ml Select	1. behandling når tunrappen har 3-5 blad 2. behandling etter behov ved ny spiring av tunrapp	
	Andre grasugras og spillkorn	40-50 ml Select	Når grasugraset har 3-5 blad (Se også under tunrapp)	
Frukttrær	Tunrapp, andre grasugras og spillkorn	40-50 ml Select	Om våren når tunrappen er i vekst og /eller etter høsting.	Blomstrende eller frukt bærende grener må ikke treffes av sprøytevæska! Tilsett like mye Renol som Select i tanken
Bærbusker (bringebær, solbær, rips)	Tunrapp, andre grasugras og spillkorn	40-50 ml Select	Om våren når ugraset er vekst fram til 3-4 dager før begynnende bærblomstring, og/eller etter høsting.	Blomstrende eller bærende grener må ikke treffes av sprøytevæska! Tilsett like mye Renol som Select i tanken
Rødsvingel-frøeng	Tunrapp, andre grasugras og spillkorn	30-40 ml Select	Senhøstes etter at rødsvingelens vekst er avsluttet, oftest i oktober, men avhenger av værforhold og beliggenhet.	Tilsett like mye Renol som Select i tanken!
Kløverfrøeng	Tunrapp, floghavre, andre grasugras og spillkorn	40-50 ml Select	Om våren før begynnende kløverblomstring når ugraset har 3-5 blad	Tilsett like mye Renol som Select i tanken

## **Gunstige virkningsforhold**

Best virkning oppnås når ugraset er i god vekst og ugraset er på 3-5 bladstadiet. I tørkeperioder (lav jordfuktighet og stressede planter) og når ugraset er stort, nyttes høyeste dosering. Mot tunrapp gir høyeste dose også god virkning i buskingsstadiet. For å ha tilstrekkelig bladoverflate skal kveke og andre flerårige grasarter ha utviklet minst 3 blad. Sprøyt på tørre planter. Regn innen en time etter behandlingen kan redusere virkningen. Ved kunstig vanning, foretas behandlingen etter at plantebestandet har tørket opp.

## **Tillaging av sprøytevæske**

Fyll sprøytetanken halvfull med vann, start omrøringen, tilsett Select, deretter Renol. Etterfyll til ønsket vannmengde. Ferdigblandet sprøytevæske bør brukes innen ett døgn etter tilblanding.

For å hindre at rester av ugrasmidler forårsaker skade i følsomme kulturer, bør sprøyteutstyret rengjøres med et anbefalt rengjøringsmiddel før og etter sprøyting.

## **Sprøyteteknikk**

Det er viktig at sprøytevæsken fordeles jevnt. Avhengig av sprøyteutstyret og plantebestandets tetthet brukes fra 15 til 25 liter sprøytevæske pr. dekar. Anbefalt dysestørrelse: 4110-14/16; arbeidstrykk: 2-3 bar og kjørehastighet: 5-6 km/t. Unngå avdrift til kornåker, plen eller annen grasmark.

## **Blanding**

Bland ikke Select med andre ugrasmidler (unntak: Matrigon) eller mikronæringsstoffer. Slike midler kan brukes inntil 5 - 7 dager før, eller tidligst 5 - 7 dager etter sprøyting med Select. Radrensing eller annen jordarbeiding foretas tidligst en uke etter sprøyting. Select kan blandes med pyretroider.

## **Lagring**

Oppbevares frostfritt.

## **FORSIKTIGHETSREGLER**

Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og egnet arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når

det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes. Får man stoffet i øynene, skyl straks med store mengder vann og kontakt lege eller Gifinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00. Søl av preparat på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Vask klærne når arbeidet er ferdig. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Gifinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00. Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 12 timer etter sprøyting.

## **Rengjøring av utstyr**

Sprøyteutstyret rengjøres godt **før** bruk av Select. Tomemballasje skylles minst tre ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøytetanken

Rester i sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddning. Skyll sprøyteutstyret etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

## **Avfallshåndtering**

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort emballasje skal innleveres til mottak for spesialavfall.

## **Merk**

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede effekt. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet brukes på annen måte, eller under andre forhold enn de som er beskrevet på etiketten, bortfaller vårt ansvar.

# SELECT

## Kletodim emulsjonskonsentrat

Mot tunrapp og andre effårige grasarter, i visse kulturvekster  
(Se bruksområde)

### Sammensetning

Kletodim	240 g/liter
Aromatiske løsningsmidler	657 g/liter
Overflateaktive stoffer	29 g/liter

## ADVARSEL



HELSKADELIG

Farlig ved innånding  
Irriterer øynene og huden  
Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging  
Unngå kontakt med huden og øynene  
Unngå innånding av sprøytetåke  
Ved svelgning må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege og vis denne etikett eller emballasje  
Oppbevares innelåst og østligjengelig for barn  
Giftig for vannlevende organismer  
Skadelig for nyttedyr  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshandtering)

Avgiftsklasse 3

**BEHANDLINGSFRIST:** Potet, ert, raps, gulrot, kepaløk: 6 uker

**Jordbær på friland:** Før blomstring.

**Frukttrær:** Før kartsetting

**Bærevkster:** Før blomstring og/eller etter høsting

**Reg. nr.: 2001.3**  
**Nettoinnhold 3 liter**

**Tilvirker:** Tomen Agro Inc. USA

**Nordisk representant:** KVK AGRO A/S,  
Køge, Danmark

Importør:

**Agrovekst**

**Agrovekst Produkter AS**  
Huggenes Gård, 1581 Rygge  
Tlf. 69 26 99 80  
[www.agrovekst.no](http://www.agrovekst.no)