

Det er forbudt å bruke Perfekthion 500 S i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

#### BRUKSOMRÅDE

Perfekthion 500 S er tillatt mot enkelte skadeinsekter i korn, gras, kålvekster og pryddplanter på friland og i veksthus. I veksthus kan preparatet gi skade på mange ulike pryddplanter.

#### BEHANDLINGSFRISTER

Vekster til mat eller for må ikke behandles senere enn 21 dager før høsting.

#### VIKEMÅTE

Perfekthion 500 S er et systemisk insektmiddel som virker ved direkte kontakt og næringsopptak. Den systemiske virkningen er størst når plantene er i god vekst. Middelet blir tatt opp av blad, stengler eller røtter og transportert med saftstrømmen oppover i plantene bl.a. til nye skudd. Visse insekter som lever skjult på plantene, f.eks. i sammenrullede blad, blir drept når de suger på behandlede planter.

#### VIKESOMRÅDE

Perfekthion 500 S er virksom mot skadedyr som tege, bladlus (unntatt ferskenbladlus), sugere, sikader, mjøllus, ull-lus, trips og minerfluer

#### BRUKSRETTLING

Perfekthion 500 S blandes med vann og kan brukes sammen med andre insekt-, sopp og ugrasmidler som er pH nøytrale eller svakt sure. Blandingen må brukes omgående.

#### Korn, gras og gras til fro

Mot minerflue: Bruk 80 ml i 20-30 l vann pr dekar etter mineringen har startet.

#### Kålvekster

Mot tege og bladlus: Bruk 100 ml i 20-30 l vann pr dekar. Sprøyt ved begynnende angrep.

#### Pryddplanter i veksthus.

Mot ull-lus, skjoldlus og bladlus unntatt ferskenbladlus: Bruk 60 ml/100 l vann, det sprøytes eller vannes på plantene. Anbefalt væskemengde ved sprøyting 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup>, og ved vanning brukes ca 13 ml væske pr potte (å 12 cm/0,7 l). Sprøyt på tørre planter. Jorda bør være middels fuktig ved vanning. Følgende plantearter har vist seg mer eller mindre ømfintlige overfor Perfekthion 500 S: Anthurium, Aphelandra, Aralia, Asparagus, Begonia, Calceolaria, Chrysanthemum, Cyclamen, Felicia, Fatsia japonica, Fuchsia, Gloxinia, Hibiscus jacobina, Philodendron, Poinsettia, Prunus, Zinnia og roser.

#### Pryddplanter på friland.

Mot ull-lus, skjoldlus, bladlus, sugere, mellus, sikader, tege, trips, biller og sommerfuglelarver bl.a. minermøll. Bruk 60 ml/100 l vann. Anbefalt væskemengde ved sprøyting er 200 liter pr. dekar (1000 m<sup>2</sup>).

#### FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker (f.eks. av nitrilgummi), øyevern, støvler, overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L ved tillaging av sprøytevæske og ved vanlig sprøyting. Ved tåkesprøyting skal helmaske med kombinasjonsfilter A2/P3 brukes.

Vask hender og ansikt ved avbrudd i arbeidet. Skift og vask tøyet når sprøytearbeidet er ferdig og foreta kroppsvask.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen (tlf. 22591300) åpent hele døgnet). Ved svelging, kontakt lege omgående og vis etiketten hvis mulig. Forgiftninger behandles som ved andre fosforinsekticider.

Rengjør utstyret godt. Tøm skyllevannet hvor vannkilder og fiskevann ikke kan forurennes. Mindre preparatrest og vaskevann kan uskadeliggjøres ved tilsetning av 20 gram kaustisk soda eller 100 ml salmiakk-spiritus pr. liter vann. Grundig rengjort tomemballasje kan behandles som vanlig avfall.

#### LAGRING

Lagres mellom +25 og -5°C. Oppbevares adskilt fra næringsog nytelsesmidler og dyrefor. Må ikke lagres nær sterk varme eller tennkilder.

#### MERK

Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets virkning, spesielt steds- eller regionsbetingede faktorer. Herunder hører for eksempel vær- og jordforhold, kulturplantesorter, vekselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre produkter, forekomst av resistente organismer, sprøyteteknikk og så videre. Ved spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i produktets virkning eller at det kan oppstå skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.

Lotnr.:

Produksjonsdato:

® = Registrert varemerke BASF

23673 7/NO 0021

# BASF

# Perfekthion® 500 S



Dimetoat emulgerbart konsentrat

Mot enkelte skadeinsekter på korn, gras, kålvekster og pryddplanter på friland og i veksthus.

Sammensetning:

Dimetoat ..... 500 g/l      Sykloheksanon ..... 449 g/l

Andre stoffer ..... 51 g/l

 <b>HELSEKADDELIG</b>	Farlig ved innånding og svelging Fare for alvorlig øyeskade <b>OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG FOR BARN</b> <b>GIFTIG FOR FISK</b> - må ikke brukes nærmere åpent vann enn 10 meter Bruk egnet verneutstyr. Uskadeliggjør tomemballasjen <b>HELSEKADDELIG</b> (Se forsiktighetsregler)	Farlig for bier  <b>BRANNFARLIG</b> Forbitt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon

BEHANDLINGSFRIST: 21 DAGER

Avgiftsklasse 4

Tilvirker:

**BASF** BASF Aktiengesellschaft  
6056 Ludwigshafen  
Tyskland

Importer:

BASF AS  
Leanbukta 40  
Postboks 233  
1372 Asker  
Tel.: 66 79 21 00

REG. NR. 2001.4

Nettoinnhold:

# 1 liter