

Mot gråskimmel, grå- og gul monilia
Teldor® Hobby



Teldor® Hobby

Bayer
HUS & HAGE



Mot gråskimmel, grå- og gul monilia
på kjerne- og steinfrukt, bringebær, hageblåbær, rips, solbær, stikkelsbær, jordbær, tomat og pryddvekster på friland og i veksthus.
Tillatt brukt i småhager etc.

Teldor® Hobby



Black
Yellow
Magenta
Cyan

Tegneriet 20-1049
17.10.2001
1korr. 19.10.2001
2korr. 22.10.2001
3korr. 22.10.2001
4korr. 24.10.2001

Teldor® Hobby
Mot gråskimmel, grå- og gul monilia

Teldor® Hobby

Fenhexamid vanddispergerbart granulat.

Teldor hobby er tillatt brukt i kjernefrukt (eple, pære), steinfrukt (plommer, sur- og søtkirsebær), jordbær på friland og i veksthus, bærvekster som bringebær, hageblåbær, rips, solbær og stikkelsbær på friland, tomat og pryddvekster i veksthus og på friland. Tillatt brukt i hobbyhager.

Sammensetning:
Fenhexamid 500 g/kg
Spred- og fyllstoffer 500 g/kg

ADVARSEL
Unngå innånding av sprøytetåke
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (Se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (Se avfallshåndtering)

Avgiftsklasse: 5

Behandlingsfrist:
Kjernefrukt og plomme: 4 uker
Sur- og søtkirsebær: 14 dager
Jordbær i veksthus: 21 dager
Jordbær på friland: 7 dager
Bringebær: 14 dager
Andre bærvekster: Før kartdanning
Tomat: 4 dager

Det er forbudt å bruke Teldor Hobby i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksrettleiding: Se vedlegg.

Forsiktighetsregler

Bruk egnede vernehansker (f. eks. av polykloropren), heldekkende overtrekksklær, støvler og vernebriller/ansiktsskjerm ved utblanding og sprøyting.

Stenk i øynene skylles straks grundig med store mengder vann.

Preparatet på huden vaskes straks av med såpe og vann.

Skift og vask tøyet når arbeidet er ferdig.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleidingen.

Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Ved skifte av preparat for sprøyting i omfintlige kulturer må sprøytetstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

Lagring: Tørt og kjølig.

Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

REG.NR: 2001.93

BA.AB
Netto 2 x 3,75 g

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen



Virkemåte

Teldor Hobby påvirker nyttefauna i liten grad.

Teldor er et kontaktfungicid med forebyggende virkning. Teldor har god regnfasthet og lang virkningstid.

Det kan ikke utelukkes at det opptrer soppraser som er resistente mot Teldor. Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst av resistente soppraser kan ikke forutsees. For å forebygge resistens, bør Teldor brukes i alternasjon med andre soppmidler med en annen virkningsmekanisme. For å motvirke resistensutvikling bør Teldor maksimalt brukes 2 ganger i samme kultur pr. vekstsesong.

Bruksrettleiding

Tillaging: Fyll sprøyten halvt med vann. Tilsett beregnet mengde Teldor og fyll etter med vann til beregnet volum sprøytevæske.

Væskemengde: Bruk en væskemengde som sørger for at alle plantedeler dekkes med sprøytevæske. Særlig er virkningen mot gråskimmel avhengig av jevn fordeling av preparatet, og at alle blomster dekkes av sprøytevæske.

Dosering: Bruk 1 pose til 7,5 liter vann. Se også sprøytetabell.

Plantetoleranse

Teldor er generelt et skånsomt preparat. Det er under normale sprøyteforhold ikke meldt om skade på de vanligste sortene av frukt og bær.

På pryddvekster kan Teldor gi noe synlig belegg på lyse blomster.

På grunn av skiftende kulturbetingelser, og da ulike sorter og arter kan reagere forskjellig, anbefales prøvesprøyting på enkeltplanter før generell bekjempelse.

Bruk 1 pose pr. 7,5 liter vann.	
HVOR - MOT HVA	NÅR/HVORDAN
Kjernefrukt (eple og pære) Mot gråskimmel og grå monilia	Ved fare for angrep sprøytes det under blomstring
Steinfrukt (moreller, plomme, sur- og søtkirsebær) og prydrær Mot grå monilia Mot grå- og gul monilia Mot gråskimmel	Sprøytes 1 - 2 ganger under blomstring. Sprøytes etter blomstring og på kart. Sprøytes ca. 2 - 4 uker før høsting.
Bringebær, rips, solbær og stikkelsbær. Mot gråskimmel	Bruk ca. 5 liter væske til 10 m rad. Sprøyt ved behov med 1 - 2 ukers mellomrom fra begynnende blomstring fram til kartdanning.
Jordbær på friland og i veksthus Mot gråskimmel	Væskemengde: Enkeltrad: 1 liter pr. m. Dobbeltrad: 1 liter pr. 0,8 m Sprøyt ved behov fra begynnende blomstring.
Pryddplanter samt tomat på friland og i veksthus. Mot gråskimmel	Sprøytes ved angrep.

Teldor® Hobby

Fenhexamid vanddisperserbar granulatur.

Teldor hobby er tillatt brukt i kjernefrukt (eple, pære), steinfrukt (plommer, sur- og søtkirsebær), jordbær på friland og i veksthus, bærvekster som bringebær, hageblåbær, rips, solbær og stikkelsbær på friland, tomat og prydvækster i veksthus og på friland. Tillatt brukt i hobbyhager.

Sammensetning:
Fenhexamid 500 g/kg
Spred- og fyllstoffer 500 g/kg

ADVARSEL
Unngå innånding av sprøytetåke
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (Se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (Se avfallshåndtering)

Avgiftsklasse: 5

Behandlingsfrist:
Kjernefrukt og plomme: 4 uker
Sur- og søtkirsebær: 14 dager
Jordbær i veksthus: 21 dager
Jordbær på friland: 7 dager
Bringebær: 14 dager
Andre bærvekster: Før kartdanning
Tomat: 4 dager

Det er forbudt å bruke Teldor Hobby i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksrettleiding: Se vedlegg.

Forsiktighetsregler

Bruk egnede vernehansker (f. eks. av polykloropren), heldekkende overtrekksklær, støvler og vernebriller/ ansiktsskjerm ved utblanding og sprøyting.
Stenk i øynene skylles straks grundig med store mengder vann.
Preparatet på huden vaskes straks av med såpe og vann.
Skift og vask tøyet når arbeidet er ferdig.
Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleidingen.
Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.
Ved skifte av preparat for sprøyting i omfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

Lagring: Tørt og kjølig.

Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

vend

REG. NR.: 2001.93 BA AB Netto 2 x 3,75 g
Importør: Bayer AS
Tilvirket: Bayer AG, Leverkusen



Planteart	Spørsmål
Prøplanter samt tomat på friland og i veksthus.	Mot graskimmel Sprøytes ved angrep.
Jordbær på friland og i veksthus	Mot graskimmel Væskemengde: Ertkeblad: 1 liter pr. m. Dobbelblad: 1 liter pr. 0,8 m Sprøyl ved behov fra begynnende blomstring.
Bringebær, rips, solbær og silkesløbær	Mot graskimmel Brnk ca. 5 liter væske til 10 m rad. Sprøyl ved behov med 1 - 2 ukers mellomrom
Steinfrukt (moreller, plomme, sur- og søtkirsebær) og pydltrær	Mot graskimmel Mot grå- og gul monilla Mot grå monilla Sprøytes 1 - 2 ganger under blomstring. Sprøytes etter blomstring og på kart. Sprøytes ca. 2 - 4 uker før høsting.
Kjernefrukt (eple og pære)	Mot graskimmel og grå monilla Ved fare for angrep sprøytes det under blomstring
HVOR - MOT HVA	NAR/HVORDAN
Brnk 1 pose pr. 7,5 liter vann.	

Plantetoleranse
Teldor er generelt et såkalsomt preparat. Det er under normale sprøyteforhold ikke meldt om skade på de vanligste sortene av frukt og bær.
På prødvækster kan Teldor gi noe synlig belegg på lyse blomster.
På grunn av skiftende kulturbehandling, og da ulike sorter og arter kan reagere forskjellig, anbefales prosprøyting på enkelteplanter for generell bekjempelse.

Resistensutvikling
Teldor Hobby påvirker nyttefauna i liten grad.
Teldor har god regnfasthet og lang virkningstid.
Det kan ikke utelukkes at det opptrer soppraser som er resistente mot Teldor. Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst av resistente soppraser kan ikke forutsettes. For å forebygge resistens, bør Teldor brukes i alternans med andre sopppidder med en annen virkningsmekanisme. For å motvirke resistensutvikling bør Teldor maksimalt brukes 2 ganger i samme kultur pr. vekstsesong.

Bruksrettleiding
Tildeling: Fyll sprøyten halvnt med vann. Tilsatt beregnet mengde Teldor og fyll etter med vann til beregnet volum sprøytevæske.
Væskemengde: bruk en væskemengde som sørger for at alle plantedeler dekkes med sprøytevæske.
Særlig er virkningsen mot graskimmel avhengig av jevn fordeling av preparatet, og at alle blomster dekkes av sprøytevæske.
Dosering: Brnk 1 pose til 7,5 liter vann. Se også sprøytetabell.

Virkemåte
Teldor Hobby påvirker nyttefauna i liten grad.
Teldor har god regnfasthet og lang virkningstid.
Det kan ikke utelukkes at det opptrer soppraser som er resistente mot Teldor. Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst av resistente soppraser kan ikke forutsettes. For å forebygge resistens, bør Teldor brukes i alternans med andre sopppidder med en annen virkningsmekanisme. For å motvirke resistensutvikling bør Teldor maksimalt brukes 2 ganger i samme kultur pr. vekstsesong.

Regneriet 1777
24.10.2001