

# ALAR<sup>®</sup> 85

## Daminozid vannløselig granulat

Til vekstregulering i pryddplanter

### SAMMENSETNING:

Daminozid ..... 850 g/kg  
Fyllstoffer ..... 150 g/kg

Det er forbudt å bruke Alar 85 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist og å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## ADVARSEL



HELSEKADDELIG

Farlig ved svelging  
Irriterer luftveiene og huden  
Risiko for alvorlig øyeskade  
Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning.  
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for småbarn  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)  
Unngå kontakt med øynene  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)  
Giftig for vannlevende organismer

Avgiftsklasse 3

### TILVIRKER:

Uniroyal Chemical Co. Inc.  
Connecticut U.S.A.

### IMPORTØR:

Felleskjøpet Øst Vest  
Postboks 469 Sentrum  
0105 Oslo  
Tlf: 22 86 10 00



Reg.nr.: 2002.11

Nettoinnhold: 1 kg

### BRUKSOMRÅDE

Alar 85 er tillatt brukt til vekstregulering av pryddplanter.

### Virkning

Alar hemmer strekningsveksten og gir plantene en mer kompakt vokseform.

### BRUKSRETTLEDNING

Vanlig dosering er 30 – 60 g til 10 liter vann. Som veiledning kan følgende angis:

Plante	Mengde til 10 l vann	Behandlingstid etc.
<i>Achimenes</i>	30 – 60 g	2 uker etter topping.
<i>Ageratum</i>	30 – 60 g	Ca. 50 dager etter såing eller 2–4 uker etter topping.
<i>Browallia</i>	30 g	2–3 ganger, første gang ved 2–3 cm lange skudd etter topping.
<i>Campanula</i>	15 – 60 g	Når skuddene har nådd pottøkanten og 10–12 dager senere.
<i>Chrysanthemum</i>	30 g	10–14 dager etter topping og 1–2 ganger senere med en ukes mellomrom.
<i>Columnnea</i>	30 g	Ca. en uke før en ønsker å se virkning.
<i>Crossandra</i>	35 g	Ved 5 cm lange skudd og 3 uker senere.
<i>Dahlia</i> (Sterkt voksende)	30 – 60 g	Når plantene er 10–12 cm lange og eventuelt en gang til 10 dager senere.
<i>Fuchsia</i>	30 – 40 g	Når skuddene er 1–2 cm etter topping og 2 uker senere.
<i>Hydrangea</i> (Hortensia)	35 – 60 g	2–3 uker etter drivingsstart.
<i>Kalanchoe</i>	30 – 60 g	Ved 2–3 cm lange skudd etter topping og deretter hver uke om sommeren og annenhver uke om vinteren.
<i>Petunia</i>	60–120 g	Første gang straks hovedskuddet begynner å strekke seg. 1–5 sprøytinger avhengig av sort og vekst i plantene. 5–6 uker etter topping og 10 dager senere.
<i>Rhododendron</i> (Asalea)	25 g	Når blomsterknoppene er synlige.
<i>Senecio</i> (Sineraria)	15 – 30 g	4–5 uker etter såing.
<i>Salvia</i>	30 – 60 g	1–2 ganger med 2 ukers mellomrom i prikkekassa.
<i>Solanium</i>	20 – 60 g	4–5 uker etter såing.
<i>Tagetes</i>	35 – 60 g	Ca. en uke før en ønsker å se virkning.
<i>Verbena</i>	60 g	

Doseringsmengde og antall behandlinger må nøye avpasses etter dyrkingstemperatur og vann/fuktighetsforhold under kulturtiden. Før sprøyting skal jorda være oppfuktet og bladene tørre. Virkningene er best ved bruk av rikelig væske. Sprøyt derfor til dryppunktet i skyet vær eller om kvelden. Ikke vann eller brus før 24 timer etter behandling. Alar er ikke prøvd i alle arter og sorter. Ved manglende erfaring bør en prøvesprøyte noen få planter før et større antall behandles.

### Blanding med andre midler

Bland ikke med andre kjemikalier.

### Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av neopren, øyevern og overtrekksdress samt forkle av neopren ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 og L brukes. Får man stoffet i øynene skylt straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonsentralen tlf. 22 59 13 00. Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etiketten eller emballasjen. Søl av preparatet på huden må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Vask klærne når arbeidet er ferdig. Anbefalt verneutstyr må benyttes dersom man går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting. Hansker bør benyttes utover denne perioden.

### Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøyte-tanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag tre ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skylt sprøyteutstyret med vann etter bruk på et sted ikke gir avrenning til vann.

### Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje innleveres til mottak for spesialavfall.

### Lagring

Alar kan lagres i pulverform. Løst i vann blir preparatet fort uvirksomt. Hvis det ved bruk av preparatet under særlige forhold skulle oppstå skader, kan selgeren ikke gjøres ansvarlig for disse.

Produksjonsår: Se separat merking på produkt.