

## BRUKSRETTLEDNING

STRATEGO



312,5 EC

**Trifloksystrobin + propikonazol**  
Emulsjonskonsentrat mot soppsykdommer på korn

**Sammensetning:**

Trifloksystrobin ..... 187,5 g/l  
Propikonazol ..... 125,0 g/l  
Spred-, klebe- og fyllstoffer ..... 797,5 g/l

HELSESKADELIG

## ADVARSEL

**Kan gi allergi ved hudkontakt**  
**Mulig fare for fosterskade**  
**Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn**  
**Unngå innånding av sprøytetåke**  
**Unngå hudkontakt**  
**Ekstremt giftig for vannlevende organismer, må ikke brukes nærmere grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter**  
**Bruk egnet verneutstyr (Se forsiktighetsreglene)**  
**Uskadeliggjør tomemballasjen (Se avfallshåndtering)**

Avgiftsklasse: 4  
Behandlingsfrist: 6 uker

**Det er forbudt å bruke Stratego 312,5 EC i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

**Bruksområde**

Stratego 312,5 EC er tillatt brukt i bygg, havre, hvete, rug og rughvete.

**Virkeområde**

Stratego er et soppmiddel med systemisk virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk, brunrust, gulrust, dvergrust og svartrust i korn. Stratego som består av to virkestoffer med systemisk virkning, tas raskt opp av kornplantenes blad og transporteres oppover i planten. Stratego virker forebyggende og kurativt, og gir ny tilvekst et visst vern. Regn et par timer etter sprøyting påvirker ikke Stratego's biologiske virkning. Best virkning oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium. Forekommer sykdomsangrep over en lengere periode, trengs det gjentatte behandling. Stratego inneholder 2 virksomme stoffer som virker forskjellig på livsprosessene til soppen. Dette reduserer faren for utvikling av resistens mot midlene.

**Bruksrettledning**

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsatt preparatet/preparatene hver for seg. Etterfyll resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og utsprøyting.

**Dosering:**

Hvete, rug og rughvete 100 ml pr. dekar. Bygg og havre 80 ml. pr. dekar.  
Væskemengde: 20 – 40 liter pr. dekar avhengig av sprøyteutstyret.  
Sprøytetidspunkt: Sprøyt ved begynnende angrep eller etter varsel. Maks 2 behandlinger pr. sesong.

Korn	Sykdom	Behandlingstid
Høstkorn Høst- og vårhvete	Meldugg, gulrust, trådkølle Meldugg, gulrust, hveteaksprikk, brunrust	Høst eller tidlig vår
Bygg	Meldugg, grå øyeflekk, gulrust, dvergrust, byggbrunflekk, spragleflekk	Ved tidlig angrep: 4-5 bladstadiet og gjenta sprøytingen etter 3-4 uker om nødvendig.
Rug Havre	Meldugg, brunrust Meldugg, kronrust, havrebrunflekk, havreseptoria	Ved sent angrep: Nårangrep merkes.

**Blandbarhet**

Erfaringer har vist at Stratego under normale sprøyteforhold kan tankblandes med de fleste aktuelle plantevernmiddel.

**Forsiktighetsregler**

Bruk vernehansker (f. eks. polykloropren), øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksklær og halvmaske med kombinasjonsfilter mot støv og gass (A1, P3 S og L) brukes.

Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av.

Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks.

Vask hender og ansiktet når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Anbefalt verneutstyr (se over) må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

**Rengjøring**

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøyte-tanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes ca. 5 ganger med vann, og sprøytes ut i h. h. t. bruksrettledningen.

Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

**Avfallshåndtering**

Grundig rengjort tomemballasje kan leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

**Lagring**

Lagres tørt og kjølig, men frostfritt. Bør ikke utsettes for direkte sollys.

**Merk**

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette er ingen garanti for at produktet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis produktet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.



Importør: Bayer CropScience  
Tilvirker: Bayer CropScience, Leverkusen

REG.NR. 2002.125  
Netto: 5 liter



Bayer CropScience