

DITHANE* NewTec

Vakumpakket granulert mankozeb
Mot tørråte i potet

Sammensetning:

Mankozeb 750 g/kg

Metenamin 20 g/kg

Fyllstoffer 230 g/kg



HELSESKADELIG

ADVARSEL

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

Mulig fare for fosterskade.

Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter.

Unngå innånding av sprøytetåke.

Unngå hudkontakt.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



MILJØSKADELIG

AVGIFTSKLASSE 3

BEHANDLINGSFRIST: Potet 14 dager

Fungicid

Nettoinnhold: 10 kg e

Tilvirker: Dow AgroSciences S.A., F-67630 Lauterbourg, Frankrike

Importør: Norgesfôr AS, Torggt. 10, 0181 Oslo, tlf. 22 40 07 00

Reg. Nr.: 2003.15

Det er forbudt å bruke Dithane NewTec i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Dithane NewTec er tillatt brukt i potet.

VIRKNING

Dithane NewTec forebygger angrep av soppsykdommer ved å hindre at soppsporene spirer. Det er viktig at sprøytevæska blir jevnt fordelt og at sprøyting utføres før angrepet starter. Dithane NewTec er skånsom overfor nytteinsekter.

BRUKSRETTLEDNING

KULTUR	SOPPSYKDOM	MENGDE	SP
Potet	Potettørråte	150-200 g i 20-40 l vann pr. dekar	Når været er varmt og rått - første gang fra riset er 25-30 cm høyt. Sprøyting gjentas med 10-14 dagers mellomrom - oftest i varmt og fuktig vær.

Tillaging av sprøytevæske

Fyll tanken halvfull med vann. Tilsett Dithane NewTec og etterfyll under omrøring.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 S og L benyttes. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING:

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

LAGRING

Oppbevares tørt i originalemballasjen.