










Kunde: Klarsø
Kontaktperson: Jacob Johansen
Dato: 30-09-2016 Ordre nr.: 160449
DTP: Gitte Jepsen Korrektur nr.: 3
Etiketnr.: 023 f+b
Etiketnavn: Ugressmiddel
Format: 115x67 mm
Bar code size: 65% Screening: 54#
Materiale: -
Evt. bemærkning: -


Farver på dette digitale print kan afvige fra det endelige tryk og er således kun vejledende.



Indvendig nr. 1		Udvendig nr. 2	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Indvendig nr. 3		Udvendig nr. 4	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Indvendig nr. 5		Udvendig nr. 6	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Indvendig nr. 7		Udvendig nr. 8	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Kernediameter:	x		
Udvendig diameter:	x		
Antal etiketter pr. rulle:	x		
Antal meter pr. rulle:	x		

Z-falset

Afstand pr. slag cm tommer



Udfyldes af kunde:


Godkendt

Godkendt med rettelser

Ny korrektur udbedes

Dato/Underskrift

Korrekturen bedes underskrevet og returneret inden 3 dage.



Sammensetning

Glyfosatammoniumsalt 189,3 g/l (tilsvarende 120 g/l glyfosat)
Formuleringsstoffer og vann 970 g/l

Bruksretledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Rambo er tillatt brukt til total ugrassbekjempelse på grus- og helle ganger, uteplasser, veier, langs gjerder, og lignende og mot rotugrass under frukt- og prydlrær, under pryd- og bærbusker m.v.

BRUKSRETLEDNING

Rambo kan brukes hele vekstsesongen.

DOSERINGSTABELL:

Ugras:	Spredestyr:	ml	Dekket flate, m ²	Vannmengde liter
Nyspirt ugras, kveke og annet gras	Sprøyte	20	15-20	1
	Vannkanne m/bom	30	15-20	3
Skvallerkål, nesle, krat m.v.	Sprøyte	40	15-20	1
	Vannkanne m/bom	60	15-20	3

Dosering ved påstrykning: Rambo brukes ublandet. Stryk væsken på bladverk med svamp eller lignende. Bruk vernehansker.

OBS!

Unngå å få Rambo på nyttevekster og prydlplanter. Foreta skjermet sprøyting der vegetasjon ønskes bevart ved hjelp av for eksempel avis eller papp.

VIRKEMÅTE

Rambo er et ugrassmiddel som tas opp gjennom grønne, overjordiske plantedeler og virker mot de fleste plantearter. Kulturvekster, prydlplanter og plengras blir drept/skadd hvis sprøytevæsken kommer på bladverket (grønne plantedeler). Rambo gir sikrest virkning på planter med velutviklet bladverk. Det er tilstrekkelig å ugraset tukes. Virkningen viser seg etter 1-3 uker. Regn de første 6 timer etter behandling kan redusere virkningen. Såing og planting kan foretas etter ca. 10 dager.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker eller hansker av gummi og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uheld eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Gittinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømtes i sprøytebeholderen. Rester fra sprøyteanken fortynnes om lag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksretledningen. Skyll sprøytestyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skilte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Gründig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrate plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Oppbevares frostfritt

Importør: Vilomix Norway AS, Hensmoveien 30,
N-3516 Hønefoss, www.vilomix.no
Tlf.: +47 32 14 01 00
Tilviker: Klarsø A/S, Danmark



023b