

Tankskylledyse brukes også til skylning med rent vann, da er man sikker.

Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Skyllvannet spres på arealer hvor det ikke kan skade vegetasjon eller avling, og det ikke kan renne ut i bekker eller avløpsvann.

AVFALLSHÅNDTERING

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig lavfall.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at produktet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.



Nettoinnhold: **5 x 15 g e**

Tifensulfuron-metyl - Vannløselig minigranulat i vannløselige poser. Mot høymole og enkelte andre bredblada ugras i eng til slått, beite og fórmals

Sammensetning: Tifensulfuron-metyl 750 g/kg
Fyllstoffer 250 g/kg

BEHANDLINGSFRIST:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før 7 dager etter behandling.

Tilvirker: E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.)

Importør: **DUPONT** Du Pont Norge AS

St.Olavs Plass - Box 6641 - 0129 Oslo

Telefon: 69 28 89 66

REG. NR. ?????

© Registrert varemærke E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.) USA

K-18551/30702 - NORWAY

Seite 12

Seite 1

Seite 7

Seite 6

Eng - før 1. slått
Sprøyt 7 dager før slått når det er god vekst i ugraset, dvs når det er
HARMONY WSB har bedre virkning mot høymole enn fenoksylyter,
Det er først og fremst ved sprøyting i høa sommer og høst at
SPRØYTT STRAKS ETTER TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKEN.
skal den alltid være det siste preparatet som blir tilsatt.
tisett den tilnærmede mengde DP-kløbemiddel/ blandingspartner under
HARMONY WSB under omrøring. Fyll opp sprøytestanken med vann og
6-7,5 dekar.
Minste enhet er 15 g HARMONY WSB (=1 pose), som rekker til
Tillegning av sprøytevæske
Det brukes 50 ml (0,05 l) DP-kløbemiddel pr. 100 liter vann.
Bruk 2,0 - 2,5 g HARMONY WSB + normaldose DP-kløbemiddel i
1) DP-kløbemiddel er et produkt fra DuPont.

Dosering
HARMONY WSB brukes. Dette forbedrer virkningen på ugras som er
vanskelige å fukte. HARMONY WSB kan blandes med et MCPA-
preparat, 200 ml pr. dekar, der det er et mye løvetann og solør. Når
HARMONY WSB blandes med MCPA kan DP-kløbemiddel sløytes.

Sprøyteid
SPRØYTT STRAKS ETTER TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKEN.
HARMONY WSB kan imidlertid også brukes før 1. slått.

RESISTENS
Resistens oppstår ved et ugrasmiddel kan oppstå ved at naturlig resistente
eksemplarer av et ugraset oppformerer og blir dominerende. En slik
resistens kan oppstå ved ensidig bruk av ugrasmiddel fra samme
HARMONY WSB og TTUS) kan
HARMONY WSB hører til samme gruppe, bør
gruppe. Dette for å redusere faren for at resistens skal oppstå.
Når sprøytevæskens har tørket inn på bladene, vil ikke regn redusere
virkningen nevneverdig.

BRUKSRETTLEDNING
ENG OG BEITE
Virkingen sees først i ugrasets vekstpunkt, som blir gulbrøst og
etter sprøyting. Ytterligere synlig virkning viser seg i løpet av 1-3 uker.
Ugrasplantenes vekst stanser raskt
langvarig tørke, frarådes bruk av HARMONY WSB på grunn av fare for
Ved lavere temperaturer kan ugras-effekten bli noe redusert og det tar
lufftuktighet og temperaturen er over 12°C.
ngraset blad. Best virkning oppnås når ugraset er i god vekst, ved høy

Spedemiddel og blandbarhet
Spedemiddel DP-kløbemiddel) må alltid tilsettes sprøytevæskens når

tilsett den tilnærmede mengde DP-kløbemiddel/ blandingspartner under
stadig omrøring. Når DP-kløbemiddel skal tilsettes sprøytevæskens,
skal den alltid være det siste preparatet som blir tilsatt.
SPRØYTT STRAKS ETTER TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKEN.

LAGRING
Lagres tørt i lukket originalemballasje.

FORSIKTIGHETSREGLER
Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.
Tlf. ved ulykkestilfelle, 24-timers service 0046 8 454 22 22.

SPRØYTEUTSTYR OG BRUK
Bruk åkersprøyte som er i god teknisk stand. Kontinuerlig omrøring er
nødvendig for å hindre bunnfall. Unngå overlappning og drift av
sprøytetåke mot nærliggende nyttevekster.

RENGJØRING AV TOMEMBALLASJE
Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes
i sprøytetanken.

RENGJØRING AV SPRØYTEUTSTYR ETTER HARMONY WSB
Sprøytetstyret bør alltid rengjøres etter avsluttet sprøyting, og må
gjøres spesielt ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer,
i henhold til følgende rengjøringsprosedyre:

BRUKSOMRÅDE
HARMONY WSB er tillatt brukt i eng til slått, beite og fórmals.

VIKEMÅTE
HARMONY WSB er et systemisk ugrasmiddel. Det er et spesialmiddel
mot høymole, men virker også mot noen andre bredblada ugras i eng
og beite (se nedenfor). Det er formulert som et minigranulat, som lett kan
opplesmes i vann.
HARMONY WSB tas hovedsakelig opp gjennom bladene.
Den raske nedbrytningen av HARMONY WSB i jorda fører til at
jordvirkningen er begrenset.
Det virksomme stoffet, tifensulfuron-metyl, blir hurtig tatt opp gjennom
ugrasets blad. Best virkning oppnås når ugraset er i god vekst, ved høy
luftuktighet og temperaturen er over 12°C.
Ved lavere temperaturer kan ugras-effekten bli noe redusert og det tar
lengre tid før ugraset visner. Ved forsommertørke, eller i perioder med
langvarig tørke, frarådes bruk av HARMONY WSB på grunn av fare for
avlingsnedgang. Det bør ikke sprøytes når det er utsikter til nattefrost.
Ugrasplantenes vekst stanser raskt etter sprøyting. Ytterligere synlig
virkning viser seg i løpet av 1-3 uker. Virkningen sees først i ugrasets
vekstpunkt, som blir gulbrøst og bladene får etter hvert gule og rødlig
farger før de visner.

Seite 10

Seite 3



Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 5 meter. Unngå innånding av sprøytetåke. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Avgiftsklasse 1

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på menneske og miljø. Det er forbudt å bruke HARMONY WSB i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

Rengjøring uten montert tankskylledyse:

- 1) Etter avsluttet sprøyting fortynnes rester fra sprøytetanken omlag 5 ganger med rent vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll deretter sprøytetstyr grundig med rent vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann. Skyllvannet kan eventuelt sprøytes over den vekst som akkurat har blitt sprøytet. Glem ikke å rengjøre sprøyteta utvendig.
- 2) Fyll sprøyteta med vann tilsatt 0,5 l All Clear Extra[®] pr. 100 liter vann. Skyll slanger/bom, fyll deretter tanken med vann og la det stå i 15 minutter med omrøringen igang. Tøm sprøyteta gjennom bom/dyser, skyll tanken og bom med rent vann.
- 3) Dyser, siler og filtre rengjøres separat med samme rengjøringsmiddel og konsentrasjon som brukt til sprøyteta.
- 4) Gjenta punkt 2.
- 5) Skyll tank/sprøyteta grundig i 5 minutter samtidig som skyllvannet sprøytes ut gjennom bom og dyser. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Rengjøring med montert tankskylledyse

Er det montert tankskylledyse på sprøyteta forenkles rengjøringa mye, da det spares vann og tid. I stedet for å bruke full tank, som er beskrevet i punkt 2 og 4, brukes bare 10 - 15% av tankens kapasitet (til en tank på 1000 l brukes 100 - 150 l vann, 0,5 l All Clear Extra[®] pr. 100 l vann). Etter at slanger og bom er skylt med vaskemiddelløsningen lar man pumpe og tankskylledyse arbeide i ca. 15 minutter innen skyllvannet tømmes ut gjennom bom/dyser.

1) All Clear Extra er et produkt fra DuPont

VIRKEMÅTE
HARMONY WSB er et systemisk ugrasmiddel. Det er et spesialmiddel mot høyvåle, men virker også mot noen andre bredbladede ugras i eng og beite og frøgras (se ovenfor). Det er formulert som et minigranulat, som lett kan oppløses i vann.
HARMONY WSB tas hovedsakelig opp gjennom bladene. Den raske nedbrytningen av HARMONY WSB i jorda fører til at forvirkningen er begrenset.
Det virksomme stoffet, trifluralin-metyl, blir hurtig tatt opp gjennom

VIRKING OVERFOR GRAS OG KLØVER:
HARMONY WSB gir ofte (vanligvis) en forbigående veksthemming og gulffarging av gras i enga. Grasplantene kommer etter hvert i normal vekst igjen. Engrap, flørråig råigras, hundegras, kvein, rødsvingel, kløver får en forbigående veksthemming. Det er særlig engsvingel som kan reagere negativt ved gulffarging og at veksten stanser i 2-3 uker. Avlingssummen over to år er på samme nivå som ved behandling med andre godkjente ugrasmidler i gras.

VIRKING OVERFOR FØRMAIS
Det kan oppstå midlertidig veksthemming / gulffarging av maisen især når maisen er stresset. Sprøytet derfor alltid på maisplanter som er grønne og i aktiv vekst.
Visse sorter er følsomme overfor produktet. Bruk derfor ikke HARMONY WSB på sorter som ikke står på DuPont Norge AS's sortliste. Sortlisten kan revideres hos forhandleren eller hos DuPont

FORMAIS
Best virkning oppnås når det sprøytes på gjenvekst 2-3 uker etter avbeiting, eller beitepussing i perioden juli til september. Sprøytet når utvasset har store rosetter og er i god vekst. Er ugraset vraket etter beiting kan det sprøytes umiddelbart etter avbeiting.

SPREDMIDDEL OG BLANDBARHET
Spredmiddelet DP-klebedmiddel) må alltid tilsettes sprøytevæsken nær HARMONY WSB brukes. Dette forbedrer virkningen på ugras som er vanskelige å fukte. 1) DP-klebedmiddel er et produkt fra DuPont.

DOSERING
Bruk 1,0 g HARMONY WSB pr dekar som engangsbehandling eller

VIRKEOMRÅDE Virking overfor ugras

| FØRMAIS | GRAS TIL FØR |
|---|---|
| <p>Meget god virkning: Balderbrå Då Gjetertaske Hønsgras Meldestokk* Oljevekster* Pengeurt Tunggras Vindeslirekne Åkerminneblom*</p> | <p>Meget god virkning: Vanlig høyvåle Byhøyvåle Hundekjeks Rome Balderbrå-arter</p> |
| <p>God virkning ved gode betingelser: Haremat Rødtvetann Vassarve</p> | <p>God virkning ved gode betingelser: Engsoleie Krypssoleie Gjetertaske Marikåpe Ryllik Rødtvetann Skvallerkål Stornesle (brennesle) Tistel Vassarve</p> |
| <p>Svak eller varierende virkning: Jordrøyk Klengemaure Åkerstemorsblom</p> | <p>Svak eller varierende virkning: Løvetann Einstape</p> |

* Virkningen mot ugrasarter som er vanskelige å fukte, som meldestokk, oljeraps og åkerminneblom kan bli redusert ved ekstremt tørre forhold.

0,75 + 0,5 g pr dekar ved delt sprøyting. Tilsett normaldose DP-klebedmiddel og bruk i 20-40 liter vann pr. dekar. Det brukes 50 ml (0,05 l) DP-klebedmiddel pr. 100 liter vann.
Optimal ugrasbekjempelse oppnås ved delt sprøyting.

Delt sprøyting:

- I: 0,75 g HARMONY WSB pr daa + DP-klebedmiddel når ugraset er på frøbladstadiet
- II: 10-12 dager etter behandling I eller når nye ugras kommer opp. 0,5 g HARMONY WSB pr daa + DP-klebedmiddel.

For å oppnå best og bredest virkning i førmais anbefales en tankblanding med Titus WSB i begge behandlingene:

- I: 3 g TITUS WSB + 0,75 g HARMONY WSB pr daa + 100 ml DP-klebedmiddel pr 100 liter vann.
- II: 2 g TITUS WSB + 0,5 g HARMONY WSB pr daa + 100 ml DP-klebedmiddel pr 100 liter vann.

Sprøytetid

Best effekt oppnås om det gjennomføres delt sprøyting. Første sprøyting gjøres når ugraset står på frøbladstadiet. Andre sprøyting foretas 10 - 12 dager etter første sprøyting, eller når nye ugras står på frøbladstadiet.

NB! Ingen sprøyting må gjøres i førmais etter maisens 6-bladstadie.

Tillaging av sprøytevæske

Minste enhet er 15 g HARMONY WSB (=1 pose), som rekker til 15,0 dekar.

Fyll sprøytetanken halvfull med vann, tilsett aktuelt antall poser med HARMONY WSB under omrøring. Fyll opp sprøytetanken med vann og