

Rovral® 75 WG

Iprodion - Vanddispergerbart granulat

Sammensetning: Iprodion 750 g/kg
Fyllstoff 250 g/kg

ADVARSEL

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Mistenkes for å kunne forårsake kreft.

Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter i bærevkster og 10 meter i løk og 5 meter i resterende kulturer.

Giftig for insekter.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Behandlingsfrist:

Agurk og tomat: 4 dager

Andre spiselige kulturer: 14 dager

Rips, solbær, stikkelsbær, gulrot, kepaløk og sjalottløk: 21 dager.

Tilvirker:
BASF AGRO BV
Arnhem (NL)
Zürich Branch

Importør:
BASF AS
Lilleakerveien 2C
Postboks 563
NO-1327 Lysaker
Tlf. 66 79 21 00

Opplysninger i nødtilfelle:
Giftnifomasjonen tlf.: 22 59 13 00
BASF Vakt tlf.: +49 180 2273 112

Avgiftsklasse 4



Reg. nr. 2007.123.14

1 kg

Batchnr./ Produksjonsdato: Se emballasjen.
Holdbarhet: Minimum 2 år.



® = Reg. varemerke for BASF

81093747 NO 1054

Rovral® 75 WG

Iprodion - Vanndispergerbart granulat

Mot sopp sykdommer i Jordbær på friland og i veksthus. Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kinakål, kepaløk, sjalottløk, gulrot, endevie, kruspersille, ert og bønne på friland. Agurk, dill og salat på friland og i veksthus, og tomat i veksthus. Prydplanter i veksthus og på friland samt planter til juletrær, pyntegrønt og snitt utendørs.

Melon, kålrot, nepe, paprika og sikoriarter under oppal. Beising av frø av korsblomstra jord- og hagebruksvekster, erter, løkvekster og frø til skogplanter.

1 kg

 **BASF**
We create chemistry

81093746 NO 1054

® = Reg. varemerke for BASF



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke Rovral 75 WG i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Jordbær på friland og i veksthus. Bringebær, solbær, stikkelsbær, rips, hodekål, rosenkål, blomkål, brokkoli, kinakål, kepaløk, sjalottløk, gulrot, endevie, kruspersille, ert og bønne på friland. Agurk, dill og salat på friland og i veksthus, og tomat i veksthus. Prydplanter i veksthus og på friland samt planter til juletrær, pyntegrønt og snitt utendørs.

Melon, kålrot, nepe, paprika og sikoriarter under oppal. Beising av frø av korsblomstra jord- og hagebruksvekster, erter, løkvekster og frø til skogplanter.

BEHANDLINGSFRIST:

Agurk og tomat: 4 dager.

Andre spiselige kulturer: 14 dager.

Rips, solbær, stikkelsbær, gulrot, kepaløk og sjalottløk: 21 dager.

VIRKEMÅTE

Rovral 75 WG er et kontaktvirkende soppmiddel som ved forebyggende behandling har meget god effekt mot en rekke forskjellige sopp sykdommer. Mot enkelte sopp sykdommer som f. eks. Alternaria-arter vil Rovral 75 WG også ha en viss kurativ effekt.

VIRKEOMRÅDE

Mot vanlig gråskimmel, løkgråskimmel, løkbladgråskimmel, storknollaråtesopp, Alternaria-arter, (skulpesopp, purpurfleck-sopp m.fl.), svartskurvsopp, kålrot-torråtesopp, klosopp, snømuggsopp, kløverråtesopp m.m.

BRUKSRETTLING

Det må sørges for en kraftig omrøring i tanken før utsprøyting!

Kepaløk og Sjalottløk

Sprøyting i åkeren mot purpurfleck og gråskimmelarter.

Sprøyt fra først i juli og opptil 2 ganger seinere. Bruk 70 – 100 g Rovral 75 WG i 20 – 40 l vann pr da. Maksimalt 2 behandlinger er tillatt pr vekstsesong.

Kål

Hodekål, Rosenkål, Blomkål, Brokkoli, Kålrot, Kinakål og Nepe

Behandling under oppal mot rotbrannsopp (svartskurv), gråskimmel og frøoverførte sopp sykdommer.

- Rett etter såing/priking: Bruk 3 g i ca 0,5 l vann pr m² oppalingsflate. Belegg på bladene skylles av med rent vann.
- Senere behandling under oppalet: Bruk 5 – 7 g i 10 liter vann. For ømtålige planteslag som kinakål bør laveste dosering benyttes. Sprøyt ikke i solskinn.



- C. Rett før utplantning mot rotbrann (svatskurv) i åkeren: Bruk 100 g i 10 l vann og tilfør 2 l væske pr m² på torvblokkplanter, og 1 liter væske pr m² på pluggplanter. Skyll plantene med rent vann.

Sprøyting i åkeren mot skulpesopp og kålrottrøtåte-sopp i Hodekål, Rosenkål, Blomkål, Brokkoli, Knutekål, Kålrot, Kinakål og Nepe: Sprøyt med 70 – 100 g i 20 – 40 l vann pr da ved begynnende angrep og gjenta behandlingen én gang etter behov.

Forebyggende sprøyting mot gråskimmel på hodekål og kinakål på lager: Bruk 70 – 100 g i 20 – 40 l vann pr da 14 – 18 dager før høsting. Kålrot er ikke tillatt på friland, kun oppal. Maksimalt 2 behandlinger er tillatt i åkeren på utendørs bruk. I ømtålige kulturer som kinakål bør det ikke brukes mer enn 50 g i 100 l vann pr da. Sprøyt ikke i solskinn.

Gulrot

Mot Alternaria-bladflekk, klosopp, gråskimmel og storknolla råtesopp. Sprøyt første gang ca 15. juli – 1. august og gjenta behandlingen etter behov med 10 – 14 dagers mellomrom. Bruk 100 g Rovral 75 WG i 40 l vann pr da. Maksimalt 2 behandlinger er tillatt.

Bønner og erter

Mot gråskimmel og storknolla råtesopp. Sprøyt ved begynnende blomstring og ca 7 dager senere. Bruk 100 g Rovral 75 WG i 20 – 40 l vann pr da. Maksimalt 2 behandlinger er tillatt.

Kruspersille og dill

Behandling under oppal.

Mot frøoverførte sykdommer, rotbrann, gråskimmel, m.fl. Bruk 7g Rovral 75 WG i 10 l vann.

Sprøyting i åkeren

Mot gråskimmel og storknolla råtesopp ved begynnende angrep. Bruk 100 g Rovral 75 WG i 20 – 40 l vann pr da. Maksimalt 2 behandlinger er tillatt i åkeren.

Frilandsagurk

Behandling under oppal

Mot frøoverførte sykdommer, rotbrann, gråskimmel m. fl. Bruk 5 – 7 g Rovral 75 WG i 10 l vann.

Sprøyting i åkeren

Mot agurkbladflekk, gråskimmel og storknolla råtesopp. Sprøyt fra plantene legger seg med 10 – 14 dagers intervall. Bruk 70 g Rovral WG i 20 – 40 l vann pr da. Sprøyt ikke i solskinn. Maksimalt 2 behandlinger ved utendørs bruk.

Salat, Sikoriarter, Endivie

Sikoriarter er tillatt behandlet kun under oppal!

Behandling under oppal.

Mot frøoverførte sykdommer som rotbrann, gråskimmel m.fl. Bruk 5 g Rovral 75 WG i 10 l vann.





Sprøyting i åkeren.

Mot gråskimmel, storknolla råtesopp og svartskurv. Sprøyt etter rotfesting og gjenta behandlingen 1 – 2 ganger med 3 – 10 dagers intervall.

Mot klosopp. Sprøyt ved begynnende angrep. Bruk 50 g Rovral 75 WG i 20 – 40 l vann pr da. Sprøyt ikke i solskinn. Maksimalt 2 behandlinger er tillatt i åkeren.

Tomat, Agurk, Melon, Paprika, Kinakål, Dill, Salat

Behandling under oppal.

Mot frooverførte sykdommer, rotbrann, gråskimmel m.fl. Bruk 5 g Rovral 75 WG i 10 l vann.

Sprøyting etter planting.

Mot gråskimmel, storknolla råtesopp m.fl.

I tomat, agurk, melon og paprika sprøytes det mot gråskimmel ved begynnende angrep, og om nødvendig gjentas behandlingen med 14 dagers intervall.

Salat sprøytes mot gråskimmel like etter planting og eventuelt 1 – 2 ganger senere. Bruk 50 – 70 g Rovral 75 WG i 100 l vann. For ømtålige vekster som kinakål og salat bør det ikke brukes mer enn 50 g Rovral 75 WG i 100 l vann. Sprøyt ikke i solskinn. Maksimalt 2 behandlinger.

BÆR

Jordbær og bringebær på friland

Mot gråskimmel. Sprøyt ved begynnende blomstring og gjenta behandlingen 2 ganger senere med 5 – 7 dagers intervall. Bruk 70 – 100 g Rovral 75 WG pr 100 l vann og minst 100 l væske pr da eller pr 1000 m rad. Maksimalt 3 behandlinger

Jordbær i veksthus

Mot gråskimmel. Sprøyt ved begynnende blomstring og gjenta behandlingen 2 ganger med 5 dagers intervall. Bruk 70 g Rovral 75 WG i 60 – 100 l vann pr 1000 m rad.

Solbær, stikkelsbær og rips

Mot gråskimmel. Sprøyt ved begynnende blomstring og gjenta behandlingen 5 – 7 dager etterpå. Bruk 70 g Rovral 75 WG pr 100 l vann. Maksimalt 2 behandlinger.

PRYDPLANTER

Mot gråskimmel i **Azalea**, (Rhododendron simsii), **Chrysanthemum**, **Cyclamen**, **Kalanchoe**, **Pelargonium**, **julestjerne** (Euphorbia pulcherrima), **Senecio** og **Sinningia**.

Sprøyt ved begynnende angrep og eventuelt med ca 14 dagers intervall.

Bruk 70 g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Rovral 75 WG virker også mot Alternaria på Dianthus. Sprøyt ikke i solskinn. Unngå sprøyting på prydplanter under blomstring.

SKOPLANTESKOLER

Mot svartskurv, rottiltsopp m.fl. (Rhizoctonia-arter), Phoma-råte og gråskimmel.



Sprøyt ved begynnende angrep. Behandlingen gjentas etter behov med ca 14 dagers intervall.

Sprøyting: Bruk 100 g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Frøbeising: Bruk 5 g Rovral 75 WG pr kg frø i blandingsforhold 4 deler Rovral 75 WG til 1 del vann. Behandles tidligst mulig etter frøsanking.

Maksimalt 2 behandlinger.

BEISING AV FRØ OG SETTELØK

Korsblomstra vekster Mot skulpesopp, kålrot-tørråte og gråskimmel.

Korsblomstra jordbruksvekster (oljefrø): Bruk 270 g Rovral 75 WG pr 100 kg frø.

Korsblomstra grønnsakvekster: Bruk 400 g Rovral 75 WG pr 100 kg frø.

Erter

Mot erteflekk, ertefotsyke og rotbrann. Bruk 130 g Rovral 75 WG pr 100 kg frø.

Løkvekster

Våtbeis og konsentratbeis av setteløk mot løkbladgråskimmel, purpurflekk og løkhvitåte.

Våtbeis: Dyp løken i en oppløsning av 200 g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Mott løkhhvitåte økes doseringen til 670 g Rovral 75 WG pr 100 l vann.

Konsentratbeising gjennom dyser: Bruk 30 g Rovral 75 WG i 2 – 10 l vann pr da.

Mot løkhhvitåte økes doseringen til 100 g Rovral 75 WG pr da.

Løkfrø

Mot løkgråskimmel, løkbladgråskimmel og purpurflekk. Bruk 530 g Rovral 75 WG pr 100 kg frø.

KLIMAETS PÅVIRKNING

Klimaet har ingen direkte påvirkning for effekten av Rovral 75 WG, men høy temperatur og luftfuktighet øker de fleste soppenes infeksjonstrykk og dermed økende behov for behandling. Rovral 75 WG's effekt sees som friske planter.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE

Fyll sprøytetanken med halvparten av den vannmengden som skal brukes. Start omrøring og tilsett den tilmålte mengde Rovral 75 WG. **DET ER VIKTIG AT GRANULATET RØRES GODT UT I VANNET.** Etterfyll med resten av vannmengden. Ved en eventuell tankblanding med et annet produkt tas blandingspartneren i til slutt.

BLANDING MED ANDRE MIDLER

Rovral 75 WG kan blandes med de fleste skadedyrmidler.

Rovral 75 WG kan ikke blandes med ammonium-gjødsel.

RESISTENS

For mange soppmidler er det alminnelig risiko for forekomst av sopptyper, som er motstandsdyktige (resistente) overfor det aktive stoffet.

Under spesielt dårlige betingelser kan en endring i middelets virkning derfor ikke utelukkes. Da det generelt ikke er mulig å forutsi den konkrete risiko for resistensdannelse på grunn av de mange kultur- og anvendelsesbetingelser og påvirkningsmuligheter, fraskriver vi oss ansvaret for eventuelle skader som følge av resistensdannelse. Den anbefalte doseringen fra BASF skal ubetinget overholdes for å unngå virkningstap.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril/neopren av god kvalitet, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

HÅNTERINGSFRIST

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleiingen. Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytetstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNTERING

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Rovral 75 WG må lagres tørt. Holdbarhet: Minst 2 år fra produksjonsdatoen.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksrettleiingen er basert på forsøk og erfaring. Dersom preparatet brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.