

L129810 NORW/10K

STEREO®



312.5 EC

Cyprodinil + propikonazol - Emulsjonskonsentrat

Mot soppsykdommer på korn.

Sammensetning

Cyprodinil	250 g/l
Propikonazol	62,5 g/l

Irriterer luftveiene.

Farlig: Kan forårsake lungeskade ved svelging.

Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet. Må ikke nyttes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer og større vannforekomster enn 20 meter.

Giftig for insekter.

Unngå innånding av sprøytetåke.

Unngå hudkontakt.

Unngå kontakt med øynene.

Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Inneholder cyprodinil og propikonazol.

Inneholder tunge aromatiske hydrokarboner.

Kan gi allergisk reaksjon.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Helseskadelig



Miljøskadelig

Behandlingsfrist: 5 uker

REG. NR. 2008.1

Avgiftsklasse 3

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Crop Protection A/S
Teglverksveien 9
3400 Lier
Telefon +47 32 85 35 01



5 707239 400544

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde

Stereo® er tillatt brukt mot sopp sykdommer i havre, bygg, høst- og vårhvete, rug og rughvete.

Behandlingsfrist

Preparatet må ikke brukes senere enn 5 uker før høsting.

Virkeområde og virkemåte

Stereo® er et soppmiddel med systemisk virkning. Middelet inneholder to virkestoffer som virker på forskjellige steder i soppens utvikling. Aktivstoffene opptas hurtig i plantene og fordeles i den oppadgående og utadgående saftstrømmen. Stereo® gir beskyttelse mot soppangrep i opp til 4 uker. Stereo® har virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, hvetebladprikk, hveteaksprikk, ulike rustsopper og stråknækker.

Bruksrettledning

Sprøyt ved tydlige angrep og bruk 150 ml pr. dekar i 20-40 l vann avhengig av sprøyteutstyret. Ved lette angrep kan dosen reduseres, men da reduseres virkningstiden tilsvarende.

Maks to behandlinger pr. sesong.

Tillaging av sprøytevæske

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet/-preparatene hver for seg. Etterfyll resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og utsprøyting.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av polykloropren, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes. Får man stoffet i øynene, skylk straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. Ved svelgning må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etiketten eller emballasjen. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Vask klærne når arbeidet er ferdig.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøyte-tanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt middel.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje bringes til lovlig mottaksanlegg. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring

Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Registrerede varemerker:

Syngenta Group Company: Stereo®