

LXXXXX NORW/4L

 **ZENIT**[®] 575 EC

*Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat
Mot sopp sykdommer på korn.*

Product names marked ® or ™, the
SYNGENTA Logo and the CE FRAVIE
are trademarks of a Syngenta Group Company

5 L

 **syngenta**[®]

ZENIT[®] 575 EC

Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat

Mot sopp sykdommer på korn.

Sammensetning

Propikonazol	125 g/l
Fenpropidin	450 g/l
Fyllstoffer	406 g/l

Farlig ved innånding og svelging.

Irriterer luftveiene og huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Kan gi allergi ved hudkontakt.

Farlig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging.

Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 30 meter.

Giftig for insekter.

Unngå innånding av sprøytetåke.

Unngå hudkontakt.

Unngå kontakt med øynene.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Helseskadelig



Miljøskadelig

Behandlingsfrist: 5 uker

REG. NR. 2008.2

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Crop Protection A/S
Teglverksveien 9
3400 Lier
Telefon +47 32 85 35 01

Avgiftsklasse 4



5 707239 400322

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde

Zenit® er tillatt brukt mot sopp sykdommer på bygg, havre, hvete, rug og rughvete.

Behandlingsfrist

Preparatet må ikke brukes senere enn 5 uker dager før høsting.

Virkemåte

Zenit® er et soppmiddel med systemisk og kontaktvirkning. Zenit® tas raskt opp av kornplantenes blad og transporteres oppover i planten. Dette gir også ny tilvekst et visst vern. Zenit® inneholder 2 virksomme stoffer som virker forskjellig på livsprosessene til soppen. Dette reduserer faren for utvikling av resistens mot midlene.

Virkeområde

Zenit® har systemisk og kontaktvirkning mot meldugg, grå øyeflekk, bygg brunflekk, hvete aksprikk, brunrust, gulrust, kronrust, dvergrust og svartrust i korn. Zenit® gir dessuten tilstrekkelig beskyttelse mot svake angrep av stråknækker.

Bruksretledning

Best virkning av Zenit® oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium. Forekommer sykdomsangrep over en lengre periode, trengs det gjentatt behandling.

KORNART	SYKDOM	DOSERING (ml/da)	SPRØYTETID
Høst- og vårhvete	Meldugg Brunrust Gulrust Hveteaksprikk Hvetebladprikk	50-100	Ved tidlig angrep: Sprøyt på 4-5 bladstadiet (Z30-31) høst eller vår ved begynnende angrep. Ved seint angrep: Når angrep merkes.
Bygg	Meldugg Byggbrunfleck Grå øyefleck Gulrust Dvergrust Svartrust Aksprikk	50-100	Ved tidlig angrep: 4-5 bladstadiet (Z31). Ved seint angrep: Når angrep merkes.
Rug/Rughvete	Meldugg Brunrust	50-100	Ved begynnende angrep
Havre	Meldugg Kronrust Svartrust Havrebrunfleck	50-100	Ved begynnende angrep

Blandbarhet

Zenit® kan blandes med de fleste vanlige plantevernmidler.

Væskemengde

20-40 liter pr. dekar, avhengig av sprøyteutstyret.

Tillaging av sprøytevæske

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet/preparatene hver for seg. Etterfyll resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og utsprøyting.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av polykloropren e.l., øyevern, støvler, og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00.

Vernehansker av polykloropren e.l., støvler og overtrekksdress må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering

Rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring

Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Registrerte varemerker:

Syngenta Group Company: Zenit®



ZENIT[®] 575 EC

Propikonazol + fenpropidin - Emulsjonskonsentrat

Mot sopp sykdommer på korn.

Sammensetning

Propikonazol	125 g/l
Fenpropidin	450 g/l
Fyllstoffer	406 g/l

Farlig ved innånding og svelging.

Irriterer luftveiene og huden.

Fare for alvorlig øyeskade.

Alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved innånding, hudkontakt og svelging.

Unngå kontakt med huden og øynene.

Unngå innånding av sprøytetåke.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidsvirkninger i vannmiljøet.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker eller større vannforekomster enn 30 meter.

Inneholder propikonazol. Kan gi allergisk reaksjon.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Helseskadelig



Miljøskadelig

Behandlingsfrist: 5 uker

REG. NR. 2008.2

Avgiftsklasse 4

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Crop Protection AS
Teglverksveien 9
3400 Lier
Telefon +47 32 85 35 01

