

Duplosan® Super

Mot ugras i eng og beite uten kløver

Sammensetning:

Mekoprop-P (DMA-salt)	130 g/l
Diklorprop-P (DMA-salt)	310 g/l
MCPA (DMA-salt)	160 g/l
Vann, antiskummenidde	447 g/l

FARE

H302 Farlig ved svelging
 H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 H318 Gir alvorlig øyeskade.
 H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 P261 Unngå innåndning av aerosoler.
 P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYENENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
 Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
 P310 Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege
 P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.
 P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
 P301+P312 VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
 P330 Skyll munnen
 P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
 P405 Oppbevares innelåst.
 P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
 Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
 Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



Tilvirker:

Nufarm Deutschland GmbH
 Im MediaPark 4e
 50670 Köln
 Germany
 Tel: (+49) 221/179179-0

Importør:

Norgesfôr AS
 Mailboxes ETC 367
 0028 Oslo

REG.NR. 2008.44.14

® = Registrert varemerke for
 NUFARM

Avgiftsklasse 3

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått for 21 dager etter sprøyting

10L **Nufarm Deutschland GmbH**
 Im MediaPark 4e
 50670 Köln
 Germany
 Tel: (+49) 221/179179-0

NORGESFØR
 BONDENS TRYGGE VALG



B1080-004 0116



Nufarm

Grow a better tomorrow.

Duplosan® Super

Bruksrettleddningen må følges slik at man unngår risiko for mennesker og miljø
Det er forbudt å bruke Duplosan Super i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Duplosan Super kan brukes til sprøyting mot ugras i eng og beite uten kløver.

Kløver og andre tofrøblada kulturplanter skades.

Må ikke brukes nær veksthus eller ømfintlige kulturer som for eksempel tomat, agurk og kålvekster.

VIKEMÅTE

Duplosan Super er et selektivt, systemisk ugrasmiddel. Det tas opp gjennom ugrasets bladverk. Best virkning oppnås i varmt vær når ugraset er i god vekst.

UGRASVIRKNING

Duplosan Super virker mot mange ugrasarter, både frøgras og rotgras. Ugraset kan grupperes i III grupper avhengig av hvilken dose som er nødvendig for bekjempelse.

Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III
Balderbrå Hestehov Meldestokk Gjetertaske Tungras Vassarve Åkerdylle Åkerstemorsblom Åkersvinerot Åkermynte Åkertistel	Høyamol Syrearter Soleiearter Kjemppearter Løvetann Følblom Mjødurt	Hundekjeks Marikåpe Ryllik Stornesle Landøyda Dikesvineblom

BRUKSRETLEDDNING

Sprøytetid og dosering:

Kultur	Ugrasarter	Pr. dekar i 15-50 liter vann	Sprøytetid
Godt etablert grasmark uten kløver.	Gruppe I	250-300 ml	Når ugraset har 2-4 blad eller dannet store bladrossetter
	Gruppe II	300-400 ml	Når ugraset har dannet store bladrossetter, evt. synlige blomsterknopper om våren eller i håa etter slått eller beiting.
	Gruppe III	400-500 ml	

Sprøyt i pent, varmt vær når ugraset er i god vekst. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av PVC eller Nitril gummi, vernebriller og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00

Håndteringsfrist

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen.

Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiak eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Bør lagres kjølig, men frostfritt. I uåpnet originalemballasje holder Duplosan Super sin virkning i minst 5 år.

MERK

Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets virkning, spesielt steds- eller regionsbetingede faktorer. Herunder hører for eksempel vær- og jordforhold, kulturplantesorter, vekselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre produkter, forekomst av resistente organismer, sprøyteteknikk og så videre. Ved spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i produktets virkning eller at det kan oppstå skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.