

ROTSTOP® - TIL BEKJEMPELSE AV ROTKJUKE

Sporer av Stor Barksopp (*Phlebiopsis gigantea*) til bekjempelse av Rotkjuke (*Heterobasidion annosum* s. *lat.*) på gran- og furustubber.

Sammensetning: ROTSTOP inneholder 10^6 - 10^7 sporer av Stor Barksopp pr. gram av produkt.

ADVARSEL



Kan gi allergi ved innåndning og hudkontakt. Unngå innånding av støv. Unngå innånding av sprøytetåke. Unngå hudkontakt. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler). Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

AVGIFTSKLASSE 1

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE: ROTSTOP er tillatt brukt til bekjempelse av råtesoppen Rotkjuke på gran- og furustubber. Rotkjuke forårsaker rotråte.

VIRKEMÅTE: Stor Barksopp, er en vanlig sopp i skog, den lever på dødt trevirke og er isolert fra skog i Finland. Stor Barksopp er en naturlig konkurrent til Rotkjuke. Preparatet sprøytes på stubbeavskjæret og forhindrer at sporer fra Rotkjuke etablerer seg på stubben og sprer seg videre til levende trær.

BRUKSRETTLEDNING:

Tillaging av sprøytevæske: Ved tillaging av bruksløsningen åpnes pakningen i det ene hjørnet, og ca. 3 dl kaldt eller lunkent vann helles i posen. Innholdet blandes godt, til pulveret og vannet danner en jevn suspensjon. Innholdet i en 25 grams pakning helles i 25 l vann og blandes/ristes. Posen skylles og skyllevannet tømmes i bruksløsningen.

Gran- og furustubber: Løsningen sprøytes over stubbeavskjæret via felleaggregatet samtidig med felling av trærne. Forbruket er ca. 2 liter pr. m² med stubbe. En 25 grams pose er nok til stubbebehandling av et område tilsvarende 37 – 75 m³ virke (1,5 – 10 dekar). For lettere å se dekningsgraden på stubben tilsettes blå markeringsfarge Turf Mark i tablettform. En tablett er nok til 25 liter bruksløsning.

Behandlingstidspunkt: Behandlingen utføres fra april til november når temperaturen overstiger +5°C. I denne perioden foregår sporespredningen til Rotkjuke.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk maske med støvfilter P3, vernehansker av gummi eller plast (f.eks. nitril), øyevern, og heldekende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

RENGJØRING: Skyll sprøytestyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vannforekomster.

AVFALLSHÅNDTERING:

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

LAGRING: ROTSTOP er et biologisk produkt som inneholder levende soppsporer skal oppbevares tørt og kaldt. I uåpnet pakning i kjølerom, under +8°C, bevarer ROTSTOP sin effekt i minst 12 måneder, og i fryseboks under -18°C, i 18 måneder. Pakning som er tatt inn i varmt rom bør brukes innen en uke. Åpnet pakning samt bruksløsning bør brukes innen ett døgn. ROTSTOP skal aldri, hverken som pakning eller i bruksløsning, utsettes for temperaturer som overstiger +40°C.

MERK: Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte, eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuelle skader.

Tilvirker: VERDERA OY
Esbo, Finland

Importør: Granli planteskole
Finn Gjems
2210 Granli

Tlf. 628 27150. Fax. 628 27115. Mob. 90 17 92 50.
E-mail. finn.gjems@online.no

REG.NR.: 2008.54
Nettoinh.: 25 g
Partinr.: se emb