



STRATEGO EC 250

Trifloksystrobin og propikonazol
Emulsjonskonsentrat

5 liter

Mot soppsykdommer i korn og gras i grøntanlegg.

Sammensetning:

Trifloksystrobin	125,0 g / l
Propikonazol	125,0 g / l
Spred-, klebe- og fyllstoffer	866,0 g / l



HELSEKADELIG

ADVARSEL

Farlig ved svelging.
Irriterer øynene og luftveiene.
Meget giftig for vannlevende organismer; kan forårsake uønskede langtidseffekter i vannmiljøet.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 20 meter.

Giftig for insekter.
Unngå innånding av sprøytetåke.
Unngå kontakt med øynene.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.
Inneholder trifloksystrobin. Kan gi en allergisk reaksjon.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



MILJØKADELIG

REG. NR. 2008.59

Behandlingsfrist: 5 uker

AVGIFTSKLASSE: 3

® = reg. varemerke for Bayer CropScience

Tilvirker:
Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland

Importør:
Bayer CropScience
Postboks 43
N-3165 TJØME
Tlf. 33 39 04 04

NO79046855C



STRATEGO



EC 250

Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke Stratego® EC 250 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/ konsentrasjon

BRUKSOMRÅDE

Stratego EC 250 er tillatt brukt i bygg, havre, høst- og vårhvete, rug, rughvete og gras i grøntanlegg (golfbaner, fotballbaner og andre grasbaner, også plen i parkanlegg).

Behandlingsfrist:

Korn: 5 uker

VIRKEOMRÅDE

Stratego er et systemisk soppmiddel med god virkning mot meldugg, grå øyeflekk, byggbrunflekk, spragleflekk, havreseptoria, havrebrunflekk, hveteaksprikk (**Stagonospora nodorum**, tidligere **Septoria nodorum**), hvetebladprikk (**Septoria tritici**), brunrust, gulrust, dvergrust, kronrust og svartrust i korn samt snømugg og trådkølle i høstkorn og gras i grøntanlegg.

VIRKEMÅTE

Stratego er et soppmiddel med et bredt virkningsspekter. Produktet som består av to virkestoffer med systemisk virkning, tas raskt opp av kornplantenes blad og transporteres oppover i planten. Stratego virker forebyggende og kurativt, og gir ny tilvekst et visst vern. Regn et par timer etter sprøyting påvirker ikke Stratego's biologiske virkning. Best virkning oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium. Forekommer sykdomsangrep over en lengre periode, trengs det gjentatt behandling.

RESISTENS

Stratego EC 250 inneholder to aktivstoffer med forskjellige virkningsmekanismer. Dette reduserer risikoen for at sopper utvikler resistens overfor soppmidlet.

Generelt anbefales det å ta følgende forholdsregler for å redusere risikoen for resistens:

1. Maksimalt 1 behandling med Stratego eller andre strobilurinholdige produkter per sesong.
2. Bruk Stratego eller andre strobilurinholdige produkter forebyggende, eller så tidlig som mulig i infeksjonsforløpet.
3. Bland rene strobiluriner med midler som har en annen virkningsmekanisme og som er effektive mot de relevante soppsykdommene.

Stratego er en ferdigformulering av to aktivstoffer med forskjellige virkningsmekanismer og oppfyller derfor dette kravet.

4. Bruk doseringer (både av strobilurin og blandingspartner) som gir en effektiv bekjempelse.

STRATEGO EC 250

Da det ikke kan utelukkes at sopper utvikler resistens mot Stratego EC 250, kan tilvirker og importør ikke påta seg noe ansvar for eventuelle skader eller manglende virkning som dette kan medføre.

BRUKSRETTLING

Fyll sprøyteanken halvfull med vann. Tilsett preparatet. Etterfyll resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig

omrøring under tillaging og utsprøyting.

Væskemengde: 20 – 40 liter pr. dekar avhengig av sprøyteutstyret.
Sprøytetidspunkt: Sprøyt ved begynnende angrep eller etter varsel. Maks 1 behandling per sesong. Ved sprøyting mot overvintringssopper om høsten bør det ikke sprøytes mer enn en gang med Stratego eller andre strobilurinholdige preparater i løpet av vekstsesongen.

Dosering:

Korn	Sykdom	Dose	Behandlingstid
Høstkorn	Snømugg, trådkølle	50- 70 ml/ daa	I løpet av oktober, tidligst der snøen kommer først
Høst- og vårhvete	Meldugg, gulrust, brunrust, svartrust, hveteaksprikk (" Stagonospora nodorum "), hvetebladprikk (" Septoria tritici ")	50- 100 ml/ daa	Mot hveteaksprikk: Ikke før begynnende strekning (Z31) til aksskyting (Z55).
Bygg	Meldugg, grå øyeflekk, gulrust, dvergrust, svartrust, byggbrunflekk, spragleflekk	50- 100 ml/ daa	Grå øyeflekk: Ikke før 3- blad stadiet (Z21). Byggbrunflekk og spragleflekk: Ikke før flaggbladet er framme (Z39).
Rug og rughvete	Meldugg, brunrust, svartrust, grå øyeflekk	50- 100 ml/ daa	Største dose ved sent angrep
Havre	Meldugg, kronrust, svartrust, havrebrunflekk, havreseptoria	50- 100 ml/ daa	Når angrep merkes
Gras i grøntanlegg	Snømugg, trådkølle	50- 100 ml/ daa	I løpet av oktober, tidligst der snøen kommer først.

BLANDING MED ANDRE MIDLER

Erfaringer har vist at Stratego under normale sprøyteforhold kan tankblandes med de fleste aktuelle plantevernmidler.

LAGRING

LAGRES TØRT OG KJØLIG, MEN FROSTFRITT. BØR IKKE UTSETTES FOR DIREKTE SOLLYS.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk egnede vernehansker av f. eks. polykloropren, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/ P2 brukes. Får

man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00. Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks. Vask hender og ansiktet når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Vernehansker av for eksempel polykloropren, støvler og overtrekksdress må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

STRATEGO EC 250

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.


AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade eller manglende virkning.

® = Reg. varemerke for Bayer CropScience



Tilvirker:

Bayer CropScience AG
Monheim, Tyskland

Importør:

Bayer CropScience
Postboks 43
N-3165 TJØME
Tlf. 33 39 04 04



Bayer CropScience