

Fludioksonil - flytende konsentrat til beising

Flytende beisemiddel til bekjempelse av frøoverførte soppsykdommer på hvete, rug, bygg og havre som stinksot, hveteaksprikk og spiringsfusarioser.

Sammensetning: Fludioksonil 25 g/l, fyllstoffer 1015 g/l

FARE

H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.


P261 Unngå innånding av aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering)



UFI: 11PH-E3J7-1008-38FW

Nettoinnhold: 50 L

REG. NR. 2009.32.14

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG,
CH-4002 Basel, Sveits

Avgiftsklasse 1

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S, Danmark
Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 400742

Bruksrettlelingen må følges, slik at man unngår risiko for skade på mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Celest[®] Formula M er tillatt brukt til beising av såkorn av høst- og vårhvete, rug, bygg og havre. Kan benyttes i gårdsanlegg.

VIRKEOMRÅDE OG VIRKEMÅTE

Mot spiringfusarioser (*Fusarium spp.*), snømugg (*Microdochium nivale*), stinksot og hveteaksprikk. Celest[®] Formula M er et svakt systemisk kontaktvirkende beisemiddel som til en viss grad også har virkning mot stripesjuka i bygg, byggbrunflekk og havrebrunflekk. Frøet opptar en mindre del av middelet under beising og spiring som gir tilstrekkelig beskyttelse mot soppsykdommer i og på frøet.

BRUKSRETTLING

Celest[®] Formula M anvendes uforynnet i kontinuerlig anlegg for flytende beisemidler. Middelet påføres frøet via dyser eller rotasjonsskiver i et sprøytekammer eller i en roterende trommel. Beiseanlegg med doseringsutstyr kalibreres for beising starter. Beising med Celest[®] Formula M forringer ikke frøets lagerstabilitet eller spireevne i 2 år, likeså bevarer beisingen sin effekt etter tilsvarende lagringsperiode.

DOSERING

Hvete, rug, bygg og havre:

120-200 ml/100 kg. Høyeste dosering mot snømugg. Kornet bør være tørt (<15% vann) og spireevne og beisebehov bør være undersøkt for beising. Celest[®] Formula M kan anvendes ved temperaturer ned til 0 °C og er lagerstabil i temperaturintervallet -5 °C - +35 °C.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril/neopren og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

AVFALLSHÅNDTERING

Ubenyttet beiset såkorn bringes til lovlig avfallsanlegg. Tomemballasjen og preparatresten må innleveres til mottak for farlig avfall eller returneres importøren.

LAGRING

Lagres frostfritt.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For ytterligere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerte varemerker

Syngenta Group Company: Celest®