

Medax® Max

Vekstregulator

Til bruk i høsthvete, vårhvete, vårbygg, høstbygg, høstrug, høstrughvete og havre for å stråforkorte veksten og unngå legde.

Sammensetning:

Proheksadion-kalsium 50 g/kg
Trineksapak-etyl 75 g/kg

Formulering: WG, vannløselig granulat

ADVARSEL

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
H411 Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261 Unngå innånding av støv/aerosoler.
P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med.
P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.
P405 Oppbevares innelåst.

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Nødtilfelle: Giftinformasjonen tlf.: 22 59 13 00

BASF Vakt Telefon: +49 180 2273 112

Avgiftsklasse 1

Reg. nr. 2016.20.24

Batch Nr./Produksjonsdato: se forpakningen.

Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdatoen.

Tilvirker: BASF SE, D-67056 Ludwigshafen, Tyskland

Importør: BASF AS, Lilleakerveien 2C, Postboks 563, NO-1327 Lysaker, Tlf: 66 79 21 00

6 kg



UFI: 72X4-U4VR-W000-21SK



8 1179189 NO 2104

® = Registrert varemerke tilhørende BASF



4 041885 025258

Medax® Max

Vekstregulator

Til bruk i høsthvete, vårhvete, vårbygg, høstbygg, høstrug, høstrughvete og havre for å stråforkorte veksten og unngå legde.

6 kg



@ = Registrert varemerke tilhørende BASF



81179188 NO 2104



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon

Virkemåte

Medax® Max inneholder to aktive ingredienser, proheksadion-kalsium og trineksapak-etyl. Proheksadion-kalsium og trineksapak-etyl klassifiseres begge som acylsykloheksandioner. Virkestoffene reduserer nivået av veksthormonet gibberellin i veksten. På korn er effekten en reduksjon av avstanden mellom leddknutene. Strået på veksten blir kortere og stivere, og dermed reduseres risikoen for legde.

Begge virkestoffene er bare aktive når de omdannes til sin respektive syreform. Dette skjer når proheksadion-kalsium løses i vann, mens det for trineksapak-etyl kreves et aktivt metabolsk trinn inne i veksten. Hvor aktiv metabolismen inne i planten er, avhenger i høy grad av faktorer som fremmer tilveksten, f.eks. temperatur og fuktighet. Disse forskjellene i omdannelse til den aktive syreformen gir en raskere effekt av proheksadion-kalsium, mens effekten av trineksapak-etyl pleier å være langsommere, men varer lenger.

Trineksapak-etyl fordeles systemisk i veksten. Proheksadion-kalsium fordeles hovedsakelig oppover i veksten.

Effekter

I alle kornarterer det en svært tydelig reduksjon av strå lengden ved anbefalte doser. Ved legde er det en tydelig reduksjon av legden etter behandlinger med Medax® Max

Anbefalt bruk

Medax® Max kan brukes i høstvetete, høstbygg, høstrug, høstrughvete, vårbygg, vårhvete og havre, i samsvar med doser, tidspunkt, antall behandlinger og minste intervall mellom behandlinger som vist i tabellen nedenfor.

Virkeområde

Medax® Max gir kortere strå og reduserer risikoen for lengde.

Dosering

Vekst	Tidspunkt / utviklingsstadium, BBCH	a) Maks. dose per behandling, g/daa b) Maks. total dose per sesong, g/daa	Maks. Antall behandlinger (minste intervall mellom behandlinger)
Høstvetete	29 – 39, slutten av busking – flaggbladets slire så vidt synlig	a) 30- 75	1
	39 – 49, flaggbladets slire så vidt synlig – aksets første snerp så vidt synlig	a) 30 – 50	1
	29 – 49, slutten av busking – aksets første snerp så vidt synlig	a) 75 b) 100	2 (7 dager)

Vekst	Tidspunkt / utviklingsstadium, BBCH	a) Maks. dose per behandling, g/daa b) Maks. total dose per sesong, g/daa	Maks. Antall behandlinger (minste intervall mellom behandlinger)
Høstbygg	29 – 39, slutten av busking – flaggbladets slire så vidt synlig	a) 50 – 100	1
	39 – 49, flaggbladets slire så vidt synlig – aksets første snerp/børstespiss så vidt synlig	a) 50 – 75	1
	29 – 49, slutten av busking – aksets første snerp/børstespiss så vidt synlig	a) 100 b) 150	2 (7 dager)
Høstrug	29 – 39, slutten av busking – flaggbladets slire så vidt synlig	a) 50 – 100	1
	39 – 49, flaggbladets slire så vidt synlig – aksets første snerp/børstespiss så vidt synlig	a) 50 – 75	1
	29 – 49, slutten av busking – aksets første snerp/børstespiss så vidt synlig	a) 75 b) 100	2 (7 dager)
Høstrughvete	29 – 39, slutten av busking – flaggbladets slire så vidt synlig	a) 30 – 75	1
	39 – 49, flaggbladets slire så vidt synlig – aksets første snerp/børstespiss så vidt synlig	a) 50	1
	29 – 49, slutten av busking – aksets første snerp/børstespiss så vidt synlig	a) 75 b) 100	2 (7 dager)
Vårbygg	29 – 39, slutten av busking – flaggbladets slire så vidt synlig	a) 30 – 50 b) 50	2 (7 dager)
Vårhvete *	29 – 39, slutten av busking – flaggbladets slire så vidt synlig	a) 30 – 50* b) 50	2 (7 dager)
Havre	29 – 34, slutten av busking – den fjerde leddknuten minst 2 cm over den tredje leddknuten	a) 30 – 50	1

* Særlig i vårhvete anbefales å bare bruke 30 g/daa ved behandling etter utviklingsstadium 35.

Medax® Max bør bare brukes på vekster med god tilvekst og med god nærings- og vannstatus. Det er en fordel å sprøyte om morgenen ved fuktige forhold, men på tørre blader med lys himmel og sol. Ikke sprøyt midt på dagen ved høy lysintensitet og høye temperaturer. Behandle ved økende temperaturer over 8 grader og under 24 grader C. Ikke behandle etter nattefrost eller når nattefrost er meldt.

Doseringen kan generelt være lavere ved senere tidspunkt sammenlignet med tidligere tidspunkt. Særlig i vårhvete anbefales det å kun bruke 30 g/daa ved behandling etter utviklingsstadium 35.

Klorose/gulfarging eller brannskader på bladene kan opptre, men symptomene er forbigående og forsvinner gradvis.

Under ekstreme værforhold (vått) er et økende antall etterrenninger observert, et forsøk i havre.

Unngå dobbeltsprøying.

Ikke behandle vekster som lider av stress, f.eks. forårsaket av tørke, skadedyr, sykdommer, oksygenmangel, dårlig såbed, skader fra tidligere kjemisk behandling. Ikke behandle veksten ved senere tidspunkt/stadium enn det som anbefales. En visuell effekt som kan oppstå i slike tilfeller, kan være en forsinket utvikling hos veksten.

Blanding med andre midler

Medax® Max er i henhold til labtester fysisk og kjemisk blandbart med:

Cerone 480 SL, Sumi-Alpha 5 EC, Forbel 750 EC, Comet Pro 200 EC og Atlantis 3,6% WG.

Begynn alltid med de faste formuleringene ved blanding av to eller flere komponenter, i følgende rekkefølge: WG, WP, SG, SP. Tilsett deretter eventuelle flytende formuleringer, først vannbaserte, i rekkefølgen: SC, CS, SL. Deretter formuleringer basert på løsningsmidler, i rekkefølgen: SE, EW, EO, EC, OD, DC, ME.

Det første produktet skal alltid være fullt oppløst før neste produkt tilsettes. Pass på at omrøringen er i gang under blanding og sprøyting.

Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre virkningsmessig, men kan også føre til effekter som ikke er avdekket i forsøk.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av for eksempel nitrilgummi, ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1 /P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes for bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Førstehjelp

Hjelpespersonell bør være oppmerksom på sin egen sikkerhet. Hvis pasienten virker bevisstløs, plasseres denne i stabilt sideleie. Ta av forurensede klær. Hvis problemer oppstår. Oppsøk lege. Vis emballasje, etikett og/eller sikkerhetsdatablad for lege. Unngå kontakt med hud, øyne og klær.

Ved innånding: Hvile, frisk luft, søk legehjelp. Ved hudkontakt: Vask grundig med såpe og vann. Ved kontakt med øynene: Skyll øynene med rennende vann i minst 15 minutter, hold øyelokkene atskilt. Svelging: Skyll straks munnen, og drikk 200 – 300 ml vann, søk lege. Symptomer: De viktigste kjente symptomene og effektene beskrives i sikkerhetsdatabladet. Flere symptomer og effekter er ikke kjent ennå.

Behandling: Behandle etter symptomer (sanering, vitale funksjoner), ingen spesifikk motgift kjent.

Sprøyteteknikk

Medax® Max skal tilføres med en sprøyte som er kalibrert og kontrollert i henhold til gjeldende lovgivning. Start alltid sprøytearbeidet med en godt rengjort sprøyte.

Fyll sprøyten til 1/2–3/4 med vann. Start omrøringen. Tilsett **langsomt** ønsket mengde produkt. **Pass på at produktet løser seg ordentlig i vannet før ytterligere mengde produkt tilsettes.** Tilsett resterende mengde vann.

Omrøringen skal være på hele tiden blanding og sprøyting pågår. Bruk alltid sprøyteblandingen umiddelbart etter blanding.

Rengjør sprøyten etter bruk.

Vannmengde: 10 – 40 l/daa

Håndteringsfrist

Anbefalt verneutstyr ma nyttes dersom en gar inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøyteanken. Rester fra sprøyteanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Start alltid sprøytearbeidet med en ren sprøyte. Rengjør alltid sprøyten etter avsluttet sprøytearbeid eller ved byte av produkter i sprøyten. Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøyteanken. Rester fra sprøyteanken fortynnes om lag 10 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen.

Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Vanlig vask av verneklær med vaskemidler fjerner eventuell forurensning.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg.

Plastemballasje kildesorteres.

Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring

Ha god ventilasjon av lager og områder hvor produktene håndteres. Lagres i et låst, tørt og frostfritt område, atskilt fra næringsmidler og fôr. Beskyttes mot varme og sollys. Kan lagres i uåpnet originalemballasje i 24 måneder.

Merk

Vi garanterer for produktets bestanddeler og kvalitet. Produsenten er ikke ansvarlig for virkningskader inkludert som er oppstått på grunn av ikke anbefalt oppbevaring og/eller bruk av produktet.

Medax® Max

Vekstregulator

Til bruk i høsthvete, vårhvete, vårbygg, høstbygg, høstrug, høstrughvete og havre for å stråforkorte veksten og unngå legde.

6 kg



© = Registrert varemerke tilhørende BASF

81179188 NO 2104