

Lxxxxxx NORW/5Y
PPE xxxxxxxx




Mandipropamid + difenokonazol - suspensionskonsentrat

Mot soppsykdommer i potet.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: mandipropamid 250 g/l, Difenokonazol 250g/l, Fyllstoffer inkl. 1,2-benzisothiazol-3-on 50 g/l

Behandlingsfrist: 3 dager



UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(DIFENOCONAZOLE AND MANDIPROPAMID)

ADVARSEL

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Inneholder 1,2-benzisothiazol-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 10 meter fra overflatevann. Unngå forurensning av vannmiljø med produkt eller emballasje.

Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann. For å beskytte grunnvannet må dette produktet eller andre sprøytemidler som inneholder difenokonazol eller propikonazol ikke brukes mer enn hvert tredje år på samme areal. Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Nettoinnhold: 5 L

REG. NR. 2017.13

Avgiftsklasse 3

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark

Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 400988

Bruksrettlendningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde

Mot sopp sykdommer i potet.

Behandlingsfrist

Behandlingsfristen er 3 dager før høsting.

Virkeområde

Brukes forebyggende mot tørrfleksyke (*Alternaria*) og tørråte (*Phytophthora infestans*). Revus Top[®] har meget god effekt mot sykdommer i gruppen oomycetes, som potettørråte (*Phytophthora infestans*). Revus Top[®] har også meget god effekt mot sykdommer forårsaket av sopper, som tørrfleksyke (*Alternaria*).

Virkemåte

De to virkestoffene i Revus Top[®], mandipropamid og difenokonazol, kompletterer hverandre og gir tilsammen en meget god kontroll av tørråte og tørrfleksyke i potet. Mandipropamid er effektivt mot oomyceter. En stor mengde av mandipropamid absorberes av bladenes vokslag, hvilket sikrer en god regnfasthet. Mandipropamid virker forebyggende og hemmer sporespiring effektivt. Mandipropamid trenger inn i bladene og gir derfor en bra translaminær effekt, der hemmer det mycelvekst i inkubationstiden. Difenokonazol er effektivt mot et bredt spektrum av sopper, men ikke mot oomyceter. I potet har difenokonazol effekt mot blant annet tørrfleksyke. Difenokonazol er et triazol som hemmer ergosterolbiosyntesen. Difenokonazol tas opp av planten og forhindrer mycelvekst.

Resistens

Mandipropamid tilhører gruppen av CAA fungicider (FRAC kode 40), som vurderes å ha lav til medium risiko for utvikling av resistens. Det er ikke funnet resistens mot CAA fungicider i tørråte.

Difenokonazol er et triazol, som tilhører gruppen av DMI fungicider (FRAC kode 3), som vurderes å ha medium risiko for utvikling av resistens. Det er ikke funnet resistens mot DMI fungicider i tørrfleksyke.

For å redusere risikoen for utvikling av resistens anbefales det at også andre produkter med samme virkemekanisme (FRAC kode 40) ikke brukes til mere enn 50% av behandlingene pr. sesong.

BRUKSRETTLEDNING

| KULTUR | SYKDOM | DOSERING | Sprøytetid |
|--------|---|-----------|---|
| Potet | Potettørråte (<i>Phytophthora infestans</i>) Tørrfleksyke (<i>Alternaria solani</i> , <i>Alternaria alternata</i>) | 60 ml/daa | Revus Top® brukes forebyggende mot sykdommer i potet. BBCH 40-91 Begynnende blomsterknopdannelse til begynnende nedvisning Maks 2 behandlinger/sesong. Behandlingsintervall 14 dager. Væskemengde: 15-60 l/dekar Behandlingsfrist: 3 dager. Behandling av samme område hvert tredje år |

Bruksvilkår for å beskytte miljøet

For å beskytte vannlevende organismer har dette produktet avstandskrav til overflatevann. Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen. Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

Avstand til overflatevann

| Avdriftsreduksjon | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|
| 0 % | > 50 % | > 75 % | > 90 % |
| 10 m | 5 m | 3 m | 3 m |

Revus Top er ufarlig overfor nytteedyr og honningbier

Evt Bruksbegrensninger:

Fytotoksisitet: Revus Top® er meget selektivt i potet.

Regnfasthet: Revus Top® er regnfast så snart sprøytevæsken har tørket inn på bladene.

IPM: Revus Top® er ufarlig for nytteinsekter og bier.

Tillaging av sprøytevæske

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Tilsett preparatet/preparatene hver for seg. Etterfyll resten av vannet under omrøring. Sprøytevæsken må holdes i kontinuerlig omrøring under tillaging og utsprøyting.

Sprøyteteknikk

Revus® Top kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. En god og ensartet dekning av plantebestanden er en forutsetning for god effekt. Det anbefales å bruke medium dråpestørrelse.

Tankblanding

Ulike faktorer påvirker blandbarhet med andre preparater. Kompatibilitet med andre preparater er ikke testet. Gjør derfor alltid en prøveblanding først. Fysisk blandbarhet innebærer at ingen utfelling skjer. Les alltid respektives preparaters etikett før blanding.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av polykloropen eller lignende og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytevæske, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tel. 22 59 13 00.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøyte-tanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte plantevernmidlerrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Lagring

Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

Merk

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksrettledningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Minimum to års holdbarhet.

® = Reg

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerte varemerker

Syngenta Group Company: Revus® Top

Lxxxxxx NORW/5Y
PPE xxxxxxx




Mandipropamid + difenokonazol - suspensionskonsentrat

Mot soppsykdommer i potet.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Sammensetning: mandipropamid 250 g/l, Difenokonazol 250g/l, Fyllstoffer inkl. 1,2-benzisothiazol-3-on 50 g/l

Behandlingsfrist: 3 dager



UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(DIFENOCONAZOLE AND MANDIPROPAMID)

ADVARSEL

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Inneholder 1,2-benzisothiazol-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 10 meter fra overflatevann. Unngå forurensning av vannmiljø med produkt eller emballasje.

Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann. For å beskytte grunnvannet må dette produktet eller andre sprøytemidler som inneholder difenokonazol eller propikonazol ikke brukes mer enn hvert tredje år på samme areal. Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Nettoinnhold: 5 L

REG. NR. 2017.13


Avgiftsklasse 3

Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark
Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 400988

