

190mm



10mm
6.5mm

152mm

6.5mm
15mm

4mm



115mm

107mm

4mm



Vannløselig granulat

**Mot tofrøbladet ugras i korn med og uten
grasgjenlegg, grasrøeng og gras til fôr i eng og beite.**

Sammensetning:

Florasulam 250 g/kg

Reg. Nr.: 2017.18

Nettoinnhold: 250 g

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.

Holdbarhet: minimum to år fra produksjonsdato.

Registreringsholder: Dow AgroSciences Danmark A/S,
Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Tilvirker: Dow AgroSciences

Importør:

Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm, tlf. 03520
Norgesfôr AS, Mailboxes Etc. 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700

®™Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or
an affiliated company of Dow



UGRASMIDDEL



Advarsel

Gir alvorlig øyeirritasjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 5 meter fra overflatevann.
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.
Unngå innånding av aerosoler.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).




BEHANDLINGSFRIST: Dyr må ikke slippes på beite eller enga slås før 5 dager etter sprøyting.

AVGIFTSKLASSE: 1

P000000001705

8mm
2mm

No other Barcode to be placed on top of the label Barcode



115mm

107mm

4mm

4mm

6.5mm

165mm

152mm

6.5mm

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Primus 250 WG er tillatt brukt mot tofrøbladet ugras i korn med eller uten grasgjennlegg til før eller frø. Frøeng av alle grasarter og gras til før samt i varig eng og beite.
Må ikke brukes i gjenlegg med kløver, luserne eller andre belgvekster.

VIRKEOMRÅDE

Primus 250 WG har meget god virkning mot:
Klengemaure, vassarve (resistens mot ALS er registrert i Norge)
valmue, balderbrå-arter (resistens mot ALS er registrert i Norge),
gjetertaske, åkerreddik, åkersennep, kornblom, oljevekster,
vindeslirekne, haremat og svartstvier.

God virkning mot:

Då-arter (resistens mot ALS er registrert i Norge), hønsegras,
åkersvineblom, minneblom (forglemmegei) og løvetann.

Ugrasvirkning

	1,5 g/daa + klebemiddel	2 g/daa + klebemiddel
95-100 % effekt	Raps, rybs, gjetartaske, åkersennep	Raps, rybs, gjetartaske, klengemaure, balderbrå, kamilleblom, åkerreddik, vindeslirekne, vassarve, åkersennep, pengeurt
85-94,9 % effekt	Klengemaure, balderbrå, kamilleblom, vindeslirekne, åkerreddik, vassarve, pengeurt	Kornblom, haremat, åkerminneblom, vanleg hønsegras, åkersvineblom, løvetann
70-84,9 % effekt (opp til 2 varige blader)	Kornblom, kvassdå, haremat, åkerminneblom, vanleg hønsegras, åkersvineblom, løvetann	Tungras

VIRKEMÅTE

Primus 250 WG inneholder ALS-hemmeren florasulam og er primært et bladherbicid. Middelet tas opp gjennom plantenes bladverk, og transporteres til vekstpunktene, hvor det hindrer produksjonen av viktige aminosyrer. Dette fører igjen til rask vekststans, og planten vil etterhvert dø.

BRUKSMÅTE

Dosering:

Vekst	BBCH	Dose/ daa
Høstkorn	20-39	1,5 - 2,0 g
Vårkorn m/u grasgjennlegg*	20-39	1,5 - 2,0 g
Frøeng og eng 1. engår	20-39	1,5 g
Frøeng 2 år og eng eldre enn 2. år	20-39	1,5 - 3,0 g

*graset bør ha minst 2 blad

Blanding med andre preparater:

Primus 250 WG skal ikke tankblandes med produkter som inneholder fenoksaprop-p-etyl.


Blandbarhet med andre preparater er ikke testet. Ulike faktorer påvirker blandbarhet med andre preparater. Gjør derfor alltid en prøveblanding først, vær oppmerksom dersom det skjer synlige forandringer, som for eksempel gassutveksling eller utfelling. Les alltid respektive preparaters etikett før blanding.

Klebemiddel

Primus 250 WG skal tilsettes et klebemiddel (ikke-ionisk klebemiddel som DP-klebemiddel eller Biowet).

Jordart

Primus 250 WG kan brukes på alle jordarter.

**Regnfast**

Primus 250 WG er regnfast 1 time etter påføring.

Begrensninger i vekstskiftet:

Det er ingen restriksjoner på hvilke kulturer som kan dyrkes etter bruk av Primus 250 WG. Dette gjelder både samme høst, og påfølgende vår.

Omsåing:

Dersom det skulle være aktuelt å så om et areal som er behandlet med Primus 250 WG samme vår, kan det kun dyrkes vårkorn, mais eller gras.

Resistens forebygging

Produkt	Type	Aktivt stoff	HRAC gruppe	Risk for resistensutvikling
Primus 250 WG	Ugrasmiddel	Florasulam	B	Stor

Primus 250 WG inneholder florasulam. Florasulam er en ALS-hemmer (HRAC gruppe B). Det er stor risiko for utvikling av resistens mot det aktive stoffet. Det anbefales derfor visse forholdsregler:

- Ikke bruk middel med bare en virkemåte.
- Unngå gjentatt bruk av florasulam, og ikke oftere i 2 av 3 år
 - Når resistens mot andre ALS hemmere er registrert.
 - Når arter som lett blir resistente mot ALS- hemmere som vassarve. Alterner mellom produkter eller blandinger med andre virkemåter.
- Følg anbefalinger på doser i forhold til utvikling. Bruk høyeste dose ved bekjempelse av risikoarter.

Benytt alternative metoder til ugraskontroll.

PÅFYLLING

Primus 250 WG kan sprøytes ut med konvensjonell åkersprøyte. Preparatet kan fylles på direkt i tanken eller gjennom preparatpåfylleren. Hell i din ønskede mengde av Primus 250 WG i

halvfull sprøyte med rent vann, sett på omrøring og hell deretter i ønsket mengde vann. Omrøring skal være på under hele sprøytearbeidet.

VANNMENGDER


Ved bruk av standard eller såkalt low drift dyse er den anbefalte doseringen 10 - 30 l. vann/daa. Den minste vannmengden skal bare brukes i åpne kulturer med smått ugras. Ved sen behandling når kornet er høyere skal vannmengden økes til 20-30 l /daa. Minste anbefalt trykk er 2-3 bar.


Rengjøring

Merk! Eventuell skyllevannstank bør være av en størrelse som att sprøytevæskes tynnes ut 5 ganger. Det er spesielt viktig å rengjøre alle innvendige detaljer. Aktiver alle slanger og ventiler samt øk trykket slik at overtrykksventil i det selvrensede filteret løses ut. Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettleidingen.


Deretter vaskes tanken innvendig med vann tilsatt All Clear¹ Extra. Bruk en vannmengde tilsvarende minst 10 % av tankvolumet. Start omrøring og sprøyt litt gjennom dysene. La resten stå i systemet minst 30 minutter. Start omrøring igjen og sprøyt alt vaskevannet ut gjennom dysene. Gjør dette minst 3-5 ganger. Siler og dyser skal tas ut og rengjøres spesielt godt med 50 ml All Clear Extra /10 liter vann.

Skyll sprøyteutstyret med vann i 5 minutter og sprøy ut gjennom dyser og slanger på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med anbefalt vaskemiddel som All Clear Extra.





**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
BLANK INTENTIONALLY**



165mm

6.5mm

152mm

6.5mm

4mm

115mm

107mm

4mm

Vannløselig granulat

Mot tofrøbladet ugras i korn med og uten grasgjenlegg, grasfrøeng og gras til fôr i eng og beite.

Sammensetning:
Florasulam 250 g/kg

Reg. Nr.: 2017.18

Nettoinnhold: 250 g

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.


Holdbarhet: minimum to år fra produksjonsdato.

Registreringsholder: Dow AgroSciences Danmark A/S, Sorgenfrivej 15, DK-2800 Kgs. Lyngby, Danmark

Tilvirker: Dow AgroSciences

Importør:
Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm, tlf. 03520
Norgesfôr AS, Mailboxes Etc. 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700



®™ Trademark of The Dow Chemical Company ("Dow") or an affiliated company of Dow



Primus™ 250 WG

UGRASMIDDEL

Advarsel
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 5 meter fra overflatevann.
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.
Unngå innånding av aerosoler.
VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

BEHANDLINGSFRIST: Dyr må ikke slippes på beite eller enga slås før 5 dager etter sprøyting.

AVGIFTSKLASSE: 1