

Fibro®

INSEKTICID

Nettoinnhold:

20L

Emulsjonskonsentrat

Mot bladlus som virusvektor i potet, mot frukttre-midd i stein- og kjernefrukt samt pæresuger i pære.

Sammensetning:
Parafinolje 797 g/l
Fyllstoffer 56 g/l

GRUPPE	UNM	SKAEDYRMIDDEL
--------	-----	---------------

Avgiftsklasse 3

Reg. nr. 2017.21

Lagres frostfritt
Omrystes før bruk

Registrering: Certis Belchim B.V.
Stadsplateau 16 • 3521 AZ Utrecht
Nederland

® registrert varemerke fra
Belchim Crop Protection

FARE



Fibro®

UFI: WS31-402U-X00A-R6X9

Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen.

Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.

For å beskytte jordlevende organismer må dette produktet eller andre produkter som inneholder parafinolje ikke brukes mer enn hvert 3. år. (Gjelder for bruk i potet).

For å beskytte vannlevende organismer må dette produktet ikke brukes nærmere enn 30 m fra overflatevann. (Gjelder for bruk i pære, stein- og kjernefrukt).

For å beskytte bier og andre pollinerende insekter må dette produktet ikke brukes mens kulturen blomstrer. (Gjelder for bruk i stein- og kjernefrukt).

Må ikke brukes der biene søker næring. (Gjelder for bruk i stein- og kjernefrukt).

Må ikke brukes i nærheten av blomstrende ugress. (Gjelder for bruk i stein- og kjernefrukt).

Unngå innånding av aerosoler.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et

GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Ikke fremkall brekninger.

Beholderen leveres til en godkjent avfallsmottager.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

22_11010301_XY • 00034-NO



Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Nordisk representant: Nordisk Alkali AB
Malmö, Sverige

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Fibro® er tillatt brukt mot bladlus som virusvektor i potet, mot frukttremidd i stein- og kjernefrukt samt pæresuger i pære.

VIRKEMÅTE

Fibro® har fysisk virkning på mobile og immobile stadier (inklusive egg) av insekter og midd. Midlet danner en tynn oljefilm utenpå skadedyrene. Denne filmen hindrer tilførselen av oksygen til skadedyrenes kropp (og egg) slik at de dør. God dekkning er nødvendig for å få god virkning.

VIRKEOMRÅDE

Fibro® virker mot ikke-persistente virus som PVA og PVY ved at smittespredningen fra bladlus reduseres betraktelig. Frukttremidd bekjempes ved sprøyting fra bladsprett i stein- og kjernefrukt. Dessuten bekjempes pæresuger ved tidlig sprøyting.

RESISTENS

Fibro® er fysisk virkende, og det forventes ikke at resistens kan oppstå.

BRUKSRETTLEDNING

Potet: Benyttes for å redusere smitte med ikke-persistente virus (PVA, PVY). Fibro® må brukes forebyggende når det er risiko for angrep av bladlus. I produksjon av settepotet er det viktig at ny tilvekst behandles, og bladene holdes dekket med Fibro®-film fram til en uke før risdreping.

Bruk 0,7-1,0 liter Fibro® i 20-40 liter vann per dekar. Det kan brukes opptil 8 sprøytinger med 7 dagers mellomrom.

I potet kan det under visse forhold oppstå veksthemming. Sprøyt derfor på tørt bladverk, og helst om kvelden i overskyet vær for å minimere virkningen på kulturplantene.

Stein- og kjernefrukt: Mot frukttremidd anvendes Fibro® når en ser vinteregg fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57).

Bruk 1-1,5 liter Fibro® per 100 liter vann. Det

brukes 50-75 liter sprøytevæske per 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet. Sprøyt bare en gang pr. vekstsesong.

Pære: Mot pæresuger like før eggklekking. Bruk 1,5-2 liter Fibro® per 100 liter vann fra knoppbryting til tett klynge (BBCH 53-57).

Anbefalt væskemengde er 50-75 liter per 100 meter rad avhengig av trærnes størrelse og tetthet.

Det må maksimalt sprøytes 2 ganger per vekstsesong. 2. sprøyting foretas 2-3 dager senere hvis det er behov.

BLANDING

I potet kan det blandes med midler mot potettørråte for eksempel Ranman® Top. Det må ikke blandes med Shirlan®.

Fibro® kan blandes med insektmidlet Teppeki® og med pyretroider.

I stein- og kjernefrukt må det ikke blandes med svovelholdige midler.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE

Fyll tanken halvfull med vann. Tilsett Fibro® under omrøring, og fyll opp med vann.

BRUKSVILKÅR FOR Å BESKYTTE MILJØET

For å beskytte vannlevende organismer har dette produktet avstandskrav til overflatevann. Avstandskravet kan gjøres smalere ved å redusere sprøyteavdriften i henhold til tabellen.

Bruksområde	Avdriftsreduksjon	
	0 %	50 %
Stein- og kjernefrukt	30 m	15 m

Vilkår for å oppnå avdriftsreduksjon er beskrevet i egen veileder som er tilgjengelig på Mattilsynets nettsider. All reduksjon av avstandskrav må skje i tråd med veilederen.

LAGRING

Oppbevares tørt og kaldt, men frostfritt.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler, skal helmaske med kombinasjonsfilter A2/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Søl av preparatet på hud må straks skylles eller vaskes av.

Klær tilsølt med preparatet må fjernes straks.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

HÅNTERINGSFRIST

Anbefalt verneutstyr (hansker) må nyttes dersom en håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNTERING

Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede effekt. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet brukes på en annen måte, eller under andre forhold enn de som er beskrevet på etiketten, bortfaller vårt ansvar.