

MIRADOR®

Soppmiddel

**Sammensetning:**

Azoksystrobin 250 g/L

Fyllstoffer 840 g/L

Formulering:

Suspensjonskonsentrat

Registreringsnummer: 2017.39

Avgiftsklasse: 2

Virkemåte: FRAC 11

Importørs:

Felleskjøpet Agri SA

Depotgata 22

N-2000 Lillestrøm

Norge

Tlf 03520

www.felleskjopet.nl

Felleskjøpet Rogaland Agder

Postboks 208 Sentrum

N-4001 Stavanger

Norge

Tlf 51 88 70 00

www.fkra.no

Norgesfor AS

Mail Boxes Etc 367

N-0028 Oslo

Norge

Tlf 22 40 07 00

www.norgesfor.no

Innehaver av godkjenning:

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44

2300 København S

Danmark

Tel. +45 32 87 11 00

Tilvirker:

Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Basel

Sveits

5 L e

© ADAMA Invita N.V.

SYNMIRN05LT/01/A

MIRADOR®




Soppmiddel

Mot sopp sykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille (friland), bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hodekål, rosekål, grønnkål, kinakål, rucicola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, reddik, sukkerbete, forbete, ert til konserver, sukkererter, erter til modning, bønner, frilandsagurk, raps, rybs samt jordbær og bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

ADVARSEL



UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S., (AZOXYSTROBIN)

Inneholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 10 meter i bærvekster og 5 meter i resterende kulturer.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.


Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.



8 718077 012360 >



NORWAY

SYNMIRNOSLT/01/B



MIRADOR®




Soppmiddel

Mot sopp sykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille (friland), bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hodekål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, reddik, sukkerbete, forbete, ert til konserver, sukkererter, erter til modning, bønner, frilandsagurk, raps, rybs samt jordbær og bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

ADVARSEL



UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S., (AZOXYSTROBIN)

Inneholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 10 meter i bærvekster og 5 meter i resterende kulturer.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.



NORWAY

BRUKSOMRÅDE

Mot sopp sykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille (friland), bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hodekål, rosekål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, reddik, sukkerbete, forbete, ert til konserves, sukkererter, erter til modning, bønner, frilandsagurk, raps, rybs samt jordbær og bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.

BEHANDLINGSFRIST

Frilandsagurk: 4 dager. Jordbær (friland, tunnel, veksthus) og vårløk: 7 dager. Gulrot, persillerot og pastinakk: 10 dager.

Bønner, ert til konserves, sukkerert, salat, ruccola, kinakål, reddik, knollselleri, stangselleri, kepaløk, sjalottløk, blomkål, brokkoli, hodekål, rosekål, grønnkål, kruspersille, bladpersille, bringebær på friland, potet: 14 dager.

Raps, rybs, kålrot, nepe, rødbete, forbete, sukkerbete: 30 dager. Korn og ert til modning: 35 dager.

Purre: 42 dager.

Bringebær i veksthus og plasttunnel: Etter høsting.

VIRKEMÅTE

Mirador® inneholder azoksysstrobin som hemmer soppens åndingsprosesser. Mirador® transporterer systemisk oppover i planten og har dessuten en translaminær (bladgjennomtrengende) effekt. Mirador® bekjemper soppen mest effektivt før soppen har etablert seg på planten, derfor bør det sprøytes ved begynnende angrep eller når angrep forventes. På visse sopp sykdommer virker Mirador® også kurativt f.eks. rust og byggrunflekk. I tillegg til at Mirador® dreper sopp sykdommer effektivt, vil Mirador® føre til at planten holder seg lengere grønn. Mirador® er regnfast etter en time.

KORN

Bruksrettledning

Best virkning av Mirador® oppnås når sykdommen er på et tidlig utviklingsstadium.

Mirador® er på grunn av sin gode effekt mot Septoria særlig aktuell å bruke ved begynnende skyting. Mirador® har lang virkningstid, og beskytter kulturen opp i mot 5-6 uker, avhengig av kornets vekststighet, sykdomspress og dosering. I for-søkene har bruk av Mirador® ikke forsinket kornets modning. Mirador® er svært skånsom mot kulturen. Dette sammen med en god soppbekjempelse, god langtidseffekt og vedlikehold av plantens grønne bladareal gir høyere merutbytter av god kvalitet.

Maks en sprøyting pr. sesong når Mirador® brukes alene.

Resistensforebygging

Mirador® inneholder et strobilurin og strobiluriner er spesielt utsatt for utvikling av resistens som fører til at preparatet ikke virker lenger. Mirador® bør derfor ikke brukes alene, men blandes med andre effektive midler med annen virkningsmekanisme. Bruk ikke midler som inneholder strobiluriner mer enn to ganger pr. sesong. Bruk Mirador® ved begynnende angrep eller etter varsling.

KORNART	SYKDOM	DOSERING	SPRØYTETID
Høst- og vårhvete	Brunrust Hveteaksprikk (<i>Septoria nodorum</i>) Hvetebladprikk (<i>Septoria tritici</i>) Mjølddogg* Svertesopper	50-100	Ved tidlig angrep: Sprøyt på 4-5 bladstadiet (Z30-31) 60 ml Mirador® + 50 ml Forbel® kan være aktuelt ved tidlig mjølddoggangrep. Ved seint angrep: Full dose ved skyting (Z55) mot <i>Septoria</i> .
Bygg	Brunrust Byggbrunfleck Grå øyeflekk* Mjølddogg* Spraglefleck (<i>Ramularia</i>)	50-100	Ved tidlig angrep: 4-5 bladstadiet (Z31) 60 ml Mirador® + 50 ml Forbel® kan være aktuelt ved tidlig mjølddoggangrep og angrep av grå øyeflekk. Ved seint angrep: Full dose når angrepet merkes (Z37-49).
Rug/Rughvete	Brunrust Grå øyeflekk* Mjølddogg* (<i>Septoria</i>)	50-100	Ved tidlig angrep: 4-5 bladstadiet (Z31) 60 ml Mirador® + 50 ml Forbel® kan være aktuelt ved tidlig mjølddoggangrep og angrep av grå øyeflekk. Ved seint angrep: Full dose når angrepet merkes (Z45-49).
* Ikke fullgod effekt med Mirador® alene. Det er funnet resistens i mjølddogg i Nord-Europa mot strobiluriner, og det anbefales derfor alltid å blande Mirador® med et effektivt middel med en annen virkemekanisme f. eks. Forbel®, når mjølddogg skal bekjempes i kornet.			

GRØNNSAKER/BÆR/OLJEVEKSTER/POTET

Bruksrettledning

Foreta behandling med Mirador® ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdne gir gode betingelser for angrep.

Resistensforebygging

Effektiv sykdomsbekjempelse er en kritisk parameter for at unngå oppbygging av resistens. Derfor anbefales det at Mirador® benyttes i tankblanding eller som en del av et sprøyteprogram med andre effektive midler med en annen virkningsmekanisme. For at unngå utvikling av resistens må det ikke fortas mer enn 3 behandlinger med Mirador®.

Maksimal total dosering er 200 ml/daa pr. Sesong.

Kulturen skal alltid inspiseres for sykdomsangrep umiddelbart før sprøyting. Det beste resultat opnås ved sprøyting i de tidligste stadier av sykdoms- forløpet eller som en forebyggende behandling etter en forutgående varsling eller når værforholdene kan betinge angrep. Høyeste dose benyttes ved stort smittetrykk, mottagelige sorter og/eller ugunstige sprøyteforhold.

KORNART	SYKDOM	DOSERING (mL/daa)	SPRØYETID
Løk (kepaløk, sjalottløk, vårløk)	Løkbladskimmel (<i>Pero nospora destructor</i>) Papirfleck (<i>Phytophthora porri</i>) Purpurfleck (<i>Alternaria porri</i>) Moderat effekt mot løk- bladgråskimmel (<i>Botrytis squamosa</i>) Løkgråskimmel (<i>Botrytis allii</i>)	80-100 mL/daa	Fra 4-6 bladsstadiet. Ved begynnende angrep. 7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding. Maksimum 3 sprøytinger med Mirador® og max 200 mL/daa pr. sesong. Fuktige og kjølige værforhold i juli og august gir gode betingelser for angrep av løkbladskimmel.
Purre	Purrerust (<i>Puccinia porri</i>) Papirfleck (<i>Phytophthora porri</i>) Purpurfleck (<i>Alternaria porri</i>)	80-100 mL/daa	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding. Maksimum 3 sprøytinger med Mirador® og max 200 ml/daa pr. sesong. Ved kraftige angrep av sykdommer kan korteste sprøyteintervall være nødvendig.

KORNART	SYKDOM	DOSERING (mL/daa)	SPRØYETID
Gulrot, persillerot, pastinakk	Gulrotbladflekk (<i>Alternaria dauci</i>), (<i>Cercospora carotae</i>) Mjøldogg (<i>Erysiphe spp.</i>) Persillebladflekk (<i>Septoria petroselini</i>)	800-100 mL/daa	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Mirador®. Varmt og fuktig vær fremmer angrep av gulrotbladflekk.
Stangselleri, knollselleri, kruspersille, bladpersille	Selleribladflekk (<i>Septoria apiicola</i>) Persillebladflekk (<i>Septoria petroselini</i>)	80-100 mL/daa 8-10 mL/10 L væske/m ² under oppal	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Foreta behandling med Mirador® ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep. Maksimum 2 sprøytinger med Mirador® i felt og 1 sprøyting under oppal.
Korsblomstrede vekster (hodekål, blomkål, brokkoli, rosenkål, grønnkål, kinakål, kålrot, nepe, ruccola)	Skulpesopper (<i>Alternaria spp.</i>) Pythium-skulderråte (<i>Pythium tracheiphilum</i>) Korsblomstgråflekk (<i>Pseudosercospora capsellae</i>) Korsblomstringflekk (<i>Mycosphaerella brassicae</i>) Korsblomsthvitrust (<i>Albugo candida</i>) Kålbladskimmel (<i>Pero nospora parasitica</i>) Mjøldogg (<i>Erysiphe spp.</i>)	80-100 mL/daa 8-10 mL/10 L vann og 0,1-0,4 liter væske/m ² under oppal	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Mirador® i felt og 1 sprøyting under oppal. Foreta behandling med Mirador® ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep.

KORNART	SYKDOM	DOSERING (mL/daa)	SPRØYTETID
Salat på friland	Salatbladskimmel (<i>Bremia lactucae</i>) Salatflekk (<i>Septoria lactucae</i>)	80-100 mL/daa	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Mirador®.
Beter (rødbeter, sukkerbeter, fôrbeter)	Bladflekkjukdommer (<i>Cercospora beticola</i>), (<i>Ramularia beticola</i>) Beterust (<i>Uromyces betae</i>) Moderat effekt mot betemjældogg (<i>Erysiphe betae</i>)	80-100 mL/daa	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Mirador®.
Reddik på friland	Mjældogg Kålbladskimmel Skulpesopper Korsblomstgråflekk	80 mL/daa	Maks 1 behandling pr. hold.
Erter og bønner (erter til modning, ert til konserver, sukkererter og alle slag bønner)	Storknollet råtesopp (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>) Mjældogg (<i>Erysiphe pisi</i>) Ertefotsjuke (<i>Mycosphaella pinoides</i>) Erteflekk og brunsjuke (<i>Ascochyta spp.</i>) Moderat effekt mot ertebladskimmel (<i>Peronospora pisi</i>)	50-100 mL/daa	Før åkeren dekker. Spesielt viktig i bladrike sorter. 7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Mirador®.
Frilandsagurk	Agurkbladflekk Agurkbladskimmel	80-100 mL/daa	Forebyggende behandling med 7-14 dagers mellomrom. Maks 2 behandlinger.
Raps og rybs	Storknollet råtesopp Gråskimmel	80-100 mL/daa	Forebyggende behandling, ved full blomstring til avsluttende blomstring. Bruk 20-30 L vann/daa.

KORNART	SYKDOM	DOSERING (mL/daa)	SPRØYTETID
Potet	Tørrfleksjuke (<i>Alternaria solani</i>)	30-50 mL/daa	To behandlinger med 7-14 dagers mellomrom. Første behandling ved begynnende angrep. Høyeste dose ved kraftig angrep.
Jordbær på friland, i plasttunnel og i veksthus	Gråskimmel (<i>Botrytis cineria</i>) Mjølddogg (<i>Podosphaera macularis</i>) Lærråte (<i>Phytophthora cactorum</i>) Jordbærøyeffekt (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)	100 mL/100 L vann og 80-100 mL/daa ved dyrking i veksthus annet enn som vanlig radkultur 100 mL/100 L vann pr. 1000m enkeltrad ved dyrking i radkultur	14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Mirador®. Foreta behandling med Mirador® ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep. Behandling mot mjølddogg og gråskimmel kan være aktuelt fra begynnende blomstring til avsluttende blomstring.
Bringebær på friland. Bringebær i veksthus og plasttunnel kun etter høsting.	Gråskimmel (<i>Botrytis cineria</i>) Bringebærskuddsjuke (<i>Didymella applanata</i>) Flekkskurv (<i>Elsinoë veneta</i>) Mjølddogg (<i>Podosphaera macularis</i>)	100 mL/100 L vann og 80-100 mL/daa ved dyrking i veksthus annet enn som vanlig bringebærhekk 100 mL/100 L vann og 40-50 L pr. 100 m rad i utvokst bringebærhekk	7-14 dagers sprøyteintervall i sprøyteprogram eller i tankblanding med annet effektivt middel. Maksimum 2 sprøytinger med Mirador®. Foreta behandling med Mirador® ved de første symptomer på begynnende angrep, eller foreta en forebyggende behandling når værforholdene gir gode betingelser for angrep. Behandling mot gråskimmel på bærene er aktuelt under blomstringa, mens behandling mot stengelsjukdommer kan være aktuelt fra før blomstring og rett etter avhøsting.

SPRØYTETEKNIKK

Det anbefales å bruke 20-50 L vann (evt. mer) pr. daa. Høyeste vannmengder anvendes i tette bestand med stor bladmasse.

TEMPERATUR

Mirador® kan benyttes når dagtemperaturen er over 8-10 grader. Virkningen av produktet er forøvrig ikke særlig temperatur avhengig.

NYTTEORGANISMER

Mirador® er ikke skadelig for en lang rekke nyttedyr, herunder *Staphylinidae* (rovbiller), *Carabidae* (jordbiller), *Aranae* (edderkopper), *Aphidius* (snylte-vepse), *Coccinillidae* (mariehøner), *Syrphidae* (svirrefluer), *Chryspidae* (nett-vinger), rovmidd og bier.

BLANDBARHET

Mirador® er blandbar med Karate® og alle viktige soppmidler, insektsmidler, ugasmidler, samt mikronæringsstoffer av god kvalitet. Ved tankblanding med Forbel® skal Mirador® tilsettes først og fordeles grundig i sprøytevæsken før tilsetning av Forbel®. Kontroller alltid blandingspartnernes anbefalinger vedr. tankmix og deres bruksbegrensninger.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren e.l., ansiktsskjerm og overtreksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

HÅNTERINGSFRIST

Hansker og heldekkende arbeidstøy må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av

preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

MIRADOR®

Soppmiddel

Sammensetning:

Azoxystrobin 250 g/L

Fyllstoffer 840 g/L

Formulering:

Suspensjonskonsentrat

Registreringsnummer: 2017.39

Avgiftsklasse: 2

Virkmåte: FRAC 11

Importørs:

Felleskjøpet Agri SA

Depotgata 22

N-2000 Lillestrøm

Norge

Tlf 03520

www.felleskjopet.nl

Felleskjøpet Rogaland Agder

Postboks 208 Sentrum

N-4001 Stavanger

Norge

Tlf 51 88 70 00

www.fkra.no

Norgesfôr AS

Mail Boxes Etc 367

N-0028 Oslo

Norge

Tlf 22 40 07 00

www.norgesfor.no

Innehaver av godkjenning:

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44

2300 København S

Danmark

Tel. +45 32 87 11 00

Tilvirker:

Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Basel

Sveits



ADAMA

© ADAMA Invita N.V.

4 x 5 L

SYNMIRN05LT/01/C1

MIRADOR®

MIRADOR®

Soppmiddel



Sammensetning:

Azoxystrobin 250 g/L

Fyllstoffer 840 g/L

Formulering:

Suspensjonskonsentrat

Registreringsnummer: 2017.39

Avgiftsklasse: 2

Virkmåte: FRAC 11

Importørs:

Felleskjøpet Agri SA

Depotgata 22

N-2000 Lillestrøm

Norge

Tlf 03520

www.felleskjopet.nl

Felleskjøpet Rogaland Agder

Postboks 208 Sentrum

N-4001 Stavanger

Norge

Tlf 51 88 70 00

www.fkra.no

Norgesfor AS

Mail Boxes Etc 367

N-0028 Oslo

Norge

Tlf 22 40 07 00

www.norgesfor.no

Innehaver av godkjenning: Tilvirker:

Syngenta Nordics A/S

Strandlodsvej 44

2300 København S

Danmark

Tel. +45 32 87 11 00

Syngenta Crop Protection AG

CH-4002 Basel

Sveits


© ADAMA Invita N.V.

4 x 5 L

Mot soppsykdommer på høst- og vårhvete, bygg, rug og rughvete, potet, kepaløk, sjalottløk, vårløk, purre, gulrot, persillerot, kruspersille (friland), bladpersille, pastinakk, stangselleri, knollselleri, blomkål, brokkoli, hodekål, rosenkål, grønnkål, kinakål, ruccola, kålrot, nepe, salat på friland, rødbete, reddik, sukkerbete, førbete, ert til konserves, sukkererter, erter til modning, bønner, frilandsagurk, raps, rybs samt jordbær og bringebær på friland, plasttunnel og i veksthus.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

ADVARSEL



UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.,
(AZOXYSTROBIN)

Inneholder 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Må ikke brukes nærmere vannførende grøfter, bekker, dammer eller større vannforekomster enn 10 meter i bærvekster og 5 meter i resterende kulturer.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Bruksrettleidingen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.



NORWAY