

Feltiella-System

Midd-gallmygg (*Feltiella acarisuga* syn. *Therodiplosis persicae*)

Bruksformål: Mot spinnmidd på plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.

Sammensetning: Pupper av gallmygg blandet med trespon.

Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.

Unngå innånding av støv.

Unngå hudkontakt.

Tilvirker: Biobest N.V., Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgia

Importør: NORGRO AS, Postboks 4144, 2307 Hamar

Reg. Nr.: 2018.56

Nettoinnhold: se forpakning

**Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

Bruksområde:

Prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt- og bærvekster i veksthus, plasttunnel og innendørsbeplantninger.

Virkeområde:

Bekjemper spinnmidd (f.eks. *Tetranychus urticae* og *T. cinnabarinus*). Kan også overleve på andre små insekter hvis det er lite spinnmidd.

Virkemåte:

Voksne *F. acarisuga* søker aktivt etter spinnmiddkolonier og legger egg i disse. Larven som klekkes suger ut kroppsvæsken til spinnmidden (egg, larver, nymfer, voksne spinnmidd og dvalehunner). Det tar en uke før eggene utvikler seg til voksne larver. Deretter tar puppestadiet enda en uke før den voksne *F. acarisuga* framtrer. Utsugde midd fremtrer som brune/svarte på bladene. Et titalls gallmygglarver kan opptre samtidig på de angrepne bladene.

Utseende:

Voksne gallmygg: 1,5 - 2,0 mm lang, brunrosa med lange bein.

Egg: 0,1 - 0,25 mm, oransjerøde til halvt gjennomsiktige og skinnende.

Larver: 0,2 - 2,0 mm lange, brunoransje, og finnes i spinnmidd koloniene.

Pupper: Finnes i en hvit, flat, spunnet kokong, ofte på undersiden av bladene langs bladnervene.

Klimakrav:

Høy luftfuktighet øker klekkeprosenten til gallmyggen. Unngå kort dag, fordi diapause induseres ved daglengder under 8-9 timer.

Bruksrettledning:

Åpne begeret i veksthuset og legg innholdet i små hauger på dyrkingsmediet. Ikke utsett innholdet for direkte sollys pga. fare for uttørking. La begeret stå i kulturen i en uke. *F. acarisuga* bør kombineres med *Phytoseiulus persimilis*.

	Antall dyr/m ²	Antall m ² / 250 dyr	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende	-	-	-	-
Lett bekjempelse	1	250	Hver uke	4 x
Kraftig bekjempelse	5	50	Hver uke	4 x

Integrert plantevern:

F. acarisuga er følsom for de fleste kjemiske plantevernmidler, men kan brukes sammen med enkelte preparater som er skånsomme mot nyttedyr (søk «side effect list»). Den kan med fordel suppleres med de fleste andre nytteorganismer mot spinnmidd og andre skadegjørere.

Lagring:

Produktet bør brukes umiddelbart etter ankomst. Kan lagres maks 1-2 dager ved 8-10°C i mørket.

Forsiktighetsregler:

Ingen.

Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Produksjonsdato (evt. batchnr.):

Se forpakningen.