

NemaFelt

Nematoder (*Steinernema feltiae*)

Bruksformål: Mot jordlevende stadier av mygg (hærmygg, soppmygg (*Sciaridae spp*) og trips i diverse plantekulturer i veksthus, plastunnel og innendørs. *Steinernema feltiae* kan også virke mot minerfluelarver i bladminer ved sprøyting på bladverk.

Sammensetning: Levende juvenile stadier av nematoder i vermikulitt og mineralformulering,

**Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt.
Unngå innånding av støv.
Unngå hudkontakt.**

Reg nr: 2018.60

Nettoinnhold: se forpakning

Tilvirker: Biobest Group N.V. Ilse Velden 18, 2260 Westerlo, Belgia

Leverandør: Borregaard BioPlant ApS, Helsingforsgade 27 B, DK - 8200 Århus N

Importør: VekstMiljø as, Kvålkroken 4, 4323 Sandnes

**Bruksrettledningen må følges,
slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde.**

Bruksområde:

Frukt- og bærvekster, prydplanter, grønnsaker og krydderurter i veksthus, plasttunneler og i innendørsbeplantninger.

Virkeområde:

Bekjemper larver av hærmygg/soppmygg (*Sciaridae*) og tripsnymfer i jord. *Steinernema feltiae* kan også virke mot minerfluelarver i bladminer ved sprøyting på bladverk.

Virkemåte:

Nematodene parasitterer gjennom de naturlige åpningene eller huden til insektet. Symbiotiske bakterier skilles ut når nematodene er inne i kroppshulen. Insektet dør etter kort tid (2-3 dager). Nematodene lever av insektets innhold og når næringen er slutt forlater de kadaveret for å søke nye insekter. Nematodene har begrenset evne til å migrere, de fleste holder seg innenfor et lite område (5-10cm)

VekstMiljø as
Kvålkroken 4
4323 Sandnes

Tlf: +47 51 60 15 80
e-post: post@vekstmiljo.no
www.vekstmiljo.no
Org nr: 965 745 629 mva



Utseende:

Nematodene er små rundormer, litt under 1 mm lange.

Overvåking av skadedyr populasjonen vil indikere virkningen av nematodebehandlingen

Klimakrav:

Optimal virkning mellom 18-25 °C. Nematodene krever fuktighet, og tåler ikke direkte sollys etter utvanning og sprøyting.

Bruksrettledning:

Hele pakken med nematoder løses opp i vann. Nematodene kan fordeles ut ved bruk av en vanlig vannkanne eller ved bruk av sprøyte. Det er viktig med stadig omrøring slik at nematodene ikke synker til bunns. Ved bruk av sprøyte må alle filtre (mindre enn 1mm) fjernes for at ikke nematodene skal sette seg fast. Bruk sprøytetrykk på maksimum 5 bar. Ferdigblandet produkt må brukes med en gang.

Blandes ut i tilstrekkelig mengde vann for å dekke aktuelt areal. Det anbefales supplerende overvanning for å få nematodene til å trenge ned i jorden. Produktet kan ikke overdoseres.

	Antall /m ²	Antall m ² / 50 mill	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende	500.000	100	Hver 3.uke	-
Lett bekjempelse	500 000	100	Hver 3.uke	-
Kraftig bekjempelse	1-2 000 000	25-50	Hver uke	-

Integrert plantevern:

Kan brukes sammen med andre nytte dyr. Kan blandes med bruksopløsning av gjødselvann. For bruk med kjemiske plantevernmidler må leverandør kontaktes, eller det kan søkes i «side effect list»

Lagring:

Produktet kan lagres uåpnet i kjøleskap ved 5 °C. Holdbarhetsdato er angitt på pakken. Ferdigblandet produkt kan ikke lagres.

Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

Produksjonsdato og holdbarhet (evt. batchnr.): se forpakning