

**SWIRScontrol**  
Rovmidd (*Amblyseius swirskii*)

**Bruksformål:**

Mot bomullsmellus, veksthusmellus og amerikansk blomstertrips i plantekulturer i veksthus, plasttunnel og innendørs.

**Sammensetning:**

Inneholder alle stadier av *Amblyseius swirskii* blandet med vermikulitt og/eller sterilisert kli. Produktet inneholder også tørrfruktmidd (*Carpoglyphus lactis*) som matkilde for *A. swirskii*.

**Tilvirke:** Agrobio S.L. Ctra. Nacional 340 km. 419, La Mojonera, Almeria, Spania. 04745

**Importør:** Bombus Natur AS. Bjørkeveien 4B, 4345 Bryne, Norge

**Reg.nr:** 2018.86

**Netto innhold:** Se forpakning

**Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder.**

**Bruksområde:**

Prydplanter, grønnsaker, krydderurter, frukt og bærvekster i veksthus og plasttunnel. Innendørsbeplantninger (planter i kontorlandskap, private hjem etc.).

**Virkeområde:**

Bekjemper hovedsakelig bomullsmellus (*Bemisia tabaci*), veksthusmellus (*Trialeurodes vaporariorum*) og amerikansk blomstertrips (*Frankliniella occidentalis*).

**Virkemåte:**

*A. swirskii* stikker munn delen sin inn i byttet og suger ut kroppsvæsken. Byttedyret skrumper inn og er derfor vanskelig å oppdage i kulturen.

**Utseende:**

Nymfer og voksne rovmidd: Opptil 0.5 mm, beige-rosa, dråpeformet og korte bein. Egg: ovale, hvite gjennomsiktige.

**Klimakrav:**

Fungere best ved 20-25 °C og høy luftfuktighet f.eks. ved 60-90 % RF. Den blir inaktiv ved temperaturer under 15 °C og formerer seg ikke ved temperaturer under 18 °C. De tåler ikke frost.

**Bruksrettledning:**

Separer posene forsiktig og heng dem på stilken til plantene. Hvis produktet kommer i flaske, så spres midten på bladene i små hauger.

## Dosering:

<i>Løst materiale</i>	Antall dyr/ m <sup>2</sup>	Antall m <sup>2</sup> / 25 000 dyr	Intervall	Antall behandlinger
Forebyggende	25	1000	-	1x
Lett bekjempelse	50	500	-	1x
Kraftig bekjempelse	100	250	-	1x
<i>Poser</i>	Antall poser/m <sup>2</sup>	Antall m <sup>2</sup> / 500 poser		
Forebyggende	0,33	1500	Hver 6. uke	
Lett bekjempelse	0,33	1500	Hver 6. uke	
Kraftig bekjempelse	0,83	600	Hver 4. uke	

## Integrert plantevern:

*A. swirskii* kan med fordel suppleres med de fleste andre nytteorganismer mot trips, mellus og andre skadegjørere. *A. swirskii* er følsom for kjemiske plantevernmidlene, men kan brukes sammen med enkelte plantevernmidler som er skånsomme mot nyttedyr (se «side effect list»).

## Lagring:

Oppbevar flaksen eller boksen horisontalt i mørke ved 10-15 °C. Produktet bør ikke lagres lengre enn 48 timer. Det er anbefalt å slippe ut organismene samme dag eller dagen etter levering. De tåler ikke direkte sollys.

## Forsiktighetsregler:

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

## Avfallshåndtering:

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres.

**Produksjonsdata (evt. Bachnr):** Se forpakning