

Trineksapaketyl - dispersjonskonsentrat (DC)

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt grasfrøeng

Sammensetning: Trineksapaketyl 250 g/l, Fyllstoffer 740 g/l

**ADVARSEL**

Kan forårsake organskader (magetarmkanalen) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Søk legehjelp ved ubehag.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Ikke innånd damp/aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(TRINEXAPAC ETHYL)

UFI: UPK5-800K-F00Y-8UQ4

REG. NR. 2019.13.22

Avgiftsklasse 2

Nettoinnhold: 5 L**Tilvirker**

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark
Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 401121

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Moddevo™ er et vekstregulerende middel tillatt brukt for å fremme avling og redusere legde i høst- og vårhvete, høst- og vårbygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt grasfrøeng.

VIRKEMÅTE

Moddevo™ hemmer dannelsen av strekningshormonet gibberelin. Aktivstoffet opptas gjennom bladene og transporteres utover i planten og virker på den delen av planten som er i aktiv vekst på behandlingstidspunktet og de neste 7 – 14 dagene.


Tidlig vekstregulering gir mere røtter og jevnere busking og dermed også jevnere modning, men det gir mindre stråforkorting da det bare korter de første leddene nederst på strået. Vekstregulering i strekningsfasen forkorter og styrker de midterste leddene i strået og reduserer derved legde og stråknakk mest. Vekstregulering når flaggbladet kommer fram reduserer strekningen i de øvre delene av strået og hindrer aksknakk.

BRUKSRETTLEDNING

Vekstregulering med Moddevo™ foretas i frodig åker med utsikter til gode vekstforhold, ved fare for legde.

Doseringstabell:

| KULTUR | BEHANDLINGS-TIDSPUNKT | DOSERING (ml/daa)* Tidlig – sent beh.tidspunkt | TOTALT PER SESONG (ml/daa) | Merknad |
|-------------------|-----------------------|--|----------------------------|--|
| Høst- og vårhvete | BBCH 25-49 | 30 – 15 ml | 30 | Bruk høy dose ved tidlig sprøyting og i stråsvake sorter og lav dose ved sen sprøyting eller etter forutgående vekstregulering. Ved vedvarende gode tilvekstforhold er det best å dele totaldosen på to behandlinger. Maks 2 behandlinger med minimum 7 dagers intervall. Væskemengde: 15-25 l/daa |
| Høst- og vårbygg | BBCH 25-49 | 30 – 20 ml | 60 | |
| Havre | BBCH 25-32 | 30 – 15 ml | 30 | |
| Rug | BBCH 25-30 | 40 – 25 ml | 50 | |
| Rughvete | BBCH 25-49 | 40 – 25 ml | 50 | |

| KULTUR | BEHANDLINGS-TIDSPUNKT | DOSERING (ml/daa)* Tidlig – sent beh.tidspunkt | TOTALT PER SESONG (ml/daa) | Merknad |
|--|-----------------------|--|----------------------------|--|
| Grasfrøeng | BBCH 30-49 | 80 – 40 ml | 80 | Maksimum 2 behandlinger med minimum 7 dagers intervall. Væskemengde: 15-25 l/daa Optimalt behandlingstidspunkt: Timotei, hundegras, engrapp og kveinarter: BBCH 31-49 I timotei bør en dele dosen, spesielt i førsteårseng som er sprøytet med Hussar Plus OD. I engrapp bør maksimalt 40 ml/daa brukes ved tidlig sprøyting. Engsvingel: BBCH 31-44 Rødsvingel og raigras: BBCH 40-45 Bladfaks: BBCH 44-49 |
|  | | | | |

* Ved blanding med soppmidler som inneholder triazolol kan dosen reduseres med 20%, dog ikke lavere enn 15 ml/daa.

TILLAGING AV SPRØYTEVÆSKE

Fyll sprøytetanken halvfull med vann. Ryst dunken med Moddevo™ omhyggelig og tilsett tilmålt mengde under omrøring. Fyll så opp sprøytetanken under omrøring og sprøyt ut middelet. Doseringsanbefalingen gjelder med vannmengde på 10-40 l/daa.

VÆR OG VEKSTFORHOLD

Sprøyt på tørre planter. Best effekt får en ved sprøyting om morgenen eller formiddagen ved relativt høy luftfuktighet, samt i sol. Moddevo™ er regnfast etter 2 timer.

Under optimale opptaksforhold bør dosen reduseres. Vekstregulering bør bare brukes i frodig åker med risiko for legde. Moddevo™ må ikke brukes i åker som er under stress på grunn av sykdomsangrep/tørke eller dårlig næringstilgang (humusfattig jord).

BLANDBARHET

Moddevo™ kan blandes med aktuelle soppmidler, flere insektmidler og bladgjødslingsmidler i chelat-form. Moddevo™ kan blandes med de fleste ugrasmidler, men ikke Ally Class, Hussar eller Puma Extra. Det anbefales ikke å blande mer enn to preparater. Ved blanding med soppmidler som inneholder triazolol kan Moddevo™ dosen reduseres med 20 %, dog ikke lavere enn 15 ml/daa.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren, øyevern, støvler og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 benyttes. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vann forekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

LAGRING

Lagres frostfritt.

MERK

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

For mere informasjon om produktet se vår hjemmeside www.syngenta.no

Registrerte varemerker

Syngenta Group Company: Moddevo™

Trineksapaketyl - dispersjonskonsentrat (DC)

Vekstregulerende middel mot legde i hvete, bygg, havre, rug og rughvete, med eller uten gjenlegg, samt grasfrøeng

Sammensetning: Trineksapaketyl 250 g/l, Fyllstoffer 740 g/l

**ADVARSEL**

Kan forårsake organskader (magesarmkanalen) ved langvarig eller gjentatt eksponering.

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Søk legehjelp ved ubehag.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Ikke innånd damp/aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S.
(TRINEXAPAC ETHYL)

UFI: UPK5-800K-F00Y-8UQ4

REG. NR. 2019.13.22

Avgiftsklasse 2

Nettoinnhold: 5 L**Tilvirker**

Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel, Sveits

Importør

Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44, 2300 København S, Danmark
Tel. +45 32 87 11 00



5 707239 401121

