

## APPLIKASJON

For å unngå risiko for menneskers helse og miljø, følg bruksanvisningen. Dette produktet er kun for profesjonell bruk. PMV®-01 inneholder en mild variant av pepinosaikkvirus. Dette produktet brukes for å beskytte tomatplanter i veksthusdyrking mot alle andre isolater av pepinosaikkvirus. Planter bør være fri for pepinosaikkvirus på behandlingstidspunktet. Behandlingen utføres på tomatplanter så raskt som mulig etter planting og senest før første klase begynner å blomstre (BBCH 15-59).

Planter skal ikke behandles under oppal eller frøproduksjon. Planter behandlet med PMV®-01 skal ikke transporteres til andre produsenter eller bedrifter, med unntak av transport for avfallshåndtering.

**DOSERING:** 400 ml/da ved et sprøytevolum på - 16-30 l/da (normert arealdose (NAD) 400 mL per dekar). Hele dosen skal sprøytes direkte på tomatplantene. Når rask kolonisering er kritisk, kan det være nødvendig å øke dosen opp til maksimalt 800ml/da

**PÅFØRINGSTEKNIKK:** sprøyting

### INSTRUKSJONER FOR BRUK

- Sørg for at sprøytemiddelet er godt blandet før bruk, og at det er omrøring i sprøyteanken minst hver 2. time.
- Rengjør filterne ofte nok og homogeniser sprayløsningen regelmessig (hver 2. time).
- Ved bruk av sprøytebom for behandling av rekker bruk kun én dyse.
- Sprøytetrykket bør settes til 5 - 6 bar.
- Temperaturen på sprayløsningen skal alltid holde seg under 15°C.
- Det er viktig å merke seg at vurdering av preparatets effektivitet, samt risiko for helse og miljø er utført på preparatet alene, og ikke som en blanding med andre plantevernmidler.

### Bruksvilkår for å beskytte mennesker

Bruk vernehansker av nitril/neopren og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av støv/aerosoler, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

### LAGRINGSFORHOLD LAGRING

Holdes unna mat, drikke og dyrefôr. Oppbevares kun i originalbeholderen. Hold beholderen tett lukket.

### TØMME BEHOLDERE OG OVERSKUDSSPRAY

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøyteanken. Rester fra sprøyteanken fortynnes omlag 10 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Tomme beholdere skal under ingen omstendigheter brukes til andre formål.

For å unngå overskudd av sprøytevæske etter behandling, bør nødvendig mengde sprøyteløsning beregnes nøyaktig i henhold til området som skal behandles.



# PMV®-01

## Virusinokulering For å forhindre skader forårsaket av pepinosaikkvirus



opptil 2500 m<sup>2</sup>

1 L e



Formuleringstype: Suspensjonskonsentrat (SC)

Aktivt stoff: Pepinosaikkvirus, CH2-stamme, isolat 1906 (>5\*10<sup>5</sup> viruspartikler per µL)

Produkt for profesjonelt bruk

Inneholder svak PepMV-isolat 1906 av stamme CH2. Mikroorganismer har potensiale til å fremkalle en allergisk reaksjon.

EUH401 Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

P261 Unngå innånding av aerosoler.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se bruksvilkår for å beskytte mennesker).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

SP1 Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør sprøytutstyr nært overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.

Avgiftsklasse 1

Reg.nr.: 2024.23

Autorisasjonsinnehaver: DE CEUSTER MESTSTOFFEN nv/sa,  
Bannerlaan 79, B-2280 Grobbendonk, Belgia  
Tel: 0032 14 257 357

Netto mengde: 1L

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasje

Holdbarhet: 21 dager fra produksjonsdato i uåpna emballasje ved en lagringstemperatur på 4°C