

Zorvec Entecta™

SOPPMIDDEL

GROUP 49 | 21 FUNGICIDE

UFI: M9UA-XOV1-M00K-VXY3

Mot tørråte i potet

™ © Trademarks of Corteva Agriscience and its affiliated companies

NETTOINNHold: 5 L e



290708

2410

**MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,
Manufacturing Date ...)**

Advarsel



H351: Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av aerosoler.
P405: Oppbevares innelåst.
P391: Samle opp spill.
EUH208: Inneholder 5-chlor-2-metyl-3-isothiazolone med 2-metyl-2H-isothiazol-3-one. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH401: Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
Bruk egnet verneutstyr (se bruksvilkår for å beskytte mennesker).
SP1: Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. (Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann/unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

AVGIFTSKlasse: 4

BEHANDLINGSFRIST: 7 dager før innhøsting



Zorvec Entecta™

SOPPMIDDEL

GROUP

49

| 21

FUNGICIDE

UFI: M9UA-X0V1-M00K-VXY3

Formulering:

SE - Suspensjon-emulsjon

Sammensetning: Amisulbrom
240 g/L+ Oxathiapiprolin 48 g/L

Reg. Nr.: 2024.25

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen.

*Bland
godt før bruk,
manuelt eller
mekanisk*

Holdbarhet: Minimum to års holdbarhet fra produksjonsdato ved korrekt lagring i uåpnet emballasje. Beskyttes mot frost. Temperatur ved lagring bør ikke overstige 40 °C.

Bland godt før bruk, manuelt eller mekanisk

Tilvirker: Corteva Agriscience

Registreringsholder: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 København K - Danmark

™ Trademarks of Corteva
Agriscience and its
affiliated companies



290715

2410

Importør:

Felleskjøpet Agri, Depotgata 22,
2000 Lillestrøm tlf. 03520
Norgesfor AS, Mail Boxes Etc. 367,
0028 Oslo, tlf. 22400700
Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6,
1531 Moss, tlf. 69204770

**MANDATORY REQUIREMENT:
THIS AREA MUST BE BLANK
(for 2D Data Matrix, Lot Nr.,
Manufacturing Date ...)**

**NETTOINNHOLD:
5 L e**

Bruks- og virkeområde

Zorvec Entecta™ er et kjemisk middel som benyttes for å kontrollere tørråte i potet.

Virkemåte

Zorvec Entecta™ er et kjemisk middel som brukes for å kontrollere potettørråte (*Phytophthora infestans*) i potet med både translaminær og systemisk bevegelse i planta, og det skal brukes preventivt. Den translaminære bevegelsen i behandlede blader gir en mer ensartet beskyttelse, og systemisk bevegelse i vedvevet bidrar til å beskytte både bladene som ikke er fullstendig utvokst på det tidspunktet middelet blir brukt, og ny vekst.

Resistensforebygging

Produkt-navn	Type	Aktiv Ingrediens	Kode #FRAC-gruppe	Risiko for utvikling av resistens
Zorvec Entecta	Soppdrepende middel	Oxathiapiprolin	49	Middels til høy
		Amisulbrom	21	Middels til høy

Oxathiapiprolin er klassifisert under FRAC Code 49 og virker som en oksysterol-bindende proteininhibitor i soppceller (OSBPI). Oxathiapiprolin er ikke kryssresistent med andre aktivstoffer som brukes mot oomyceter, inkludert karboksylsyreamider (CAA), fenylamider, cymoxanil og QoI-soppmidler.

Amisulbrom er et Qil-soppmiddel (kinoninhibitorer inne i), klassifisert under FRAC-kode 21, og hemmer mitokondriell respirasjon. Virkemåten er direkte knyttet til hemming av kompleks III (cytochrome bc1 (ubiquinon reduktase)) ved Qi-stedet.

Non-printed

**Non-printed area on page 2 ONLY
(on the back of 2D code area
printed on the front page)**

For å redusere forekomsten av resistens, bør Zorvec Entecta™ brukes i et program basert på produkter med ulike virkningsmekanismer. Det er viktig å ikke overskride maksimalt antall applikasjoner gitt på denne etiketten. Når et soppmiddel med en annen virkningsmekanisme følger etter Zorvec Entecta™ (eller noen annen FRAC 49-inneholdende produkt), bør dette middelet helst ha kurativ virkning.

Bruksforhold

Påfør Zorvec Entecta under gode vekstforhold. Unngå å bruke middelet på stressede avlinger.

Bruksrettledning

Påfør Zorvec Entecta med 25 ml/daa. Det kan ikke brukes mer enn 3 behandlinger med Zorvec Entecta per sesong. Veksle med soppmidler som har andre virkningsmekanismer i sprøyteprogrammene. Hvis det totale antallet sprøytinger mot tørråte er mellom 6 og 10, reduser til maks. 2 applikasjoner med Zorvec Entecta, og hvis det er 5 eller mindre, reduser til maks. 1 applikasjon per sesong med Zorvec Entecta.

Det anbefales å bruke et intervall på 7 dager, men i situasjoner med lavt smittepress, bruk 10 dagers intervall.

Den tidligste påføringstiden er BBCH 51 (første individuelle knopper (1–2 mm) av den første blomsterstanden synlige på hovedstengelen) og varer frem til BBCH 89 (bær: skrumpet og frøene mørke). Den ideelle påføringstiden er å påføre forebyggende før de første synlige tegnene på sykdom.

Doseringstabell

Avling	Max dose pr. behandling	Antall påføringer per sesong	Min. – maks. sprøyteintervall	Sykdommer kontroll
Potet	25 ml/daa	max 3 * behandlinger	7–10 dager**	Potettørråte (<i>Phytophthora infestans</i>)
	maksimal totaldose per år 75 mL/daa			

* Ingen påfølgende påføring av soppdrepende midler tilhører FRAC 49 (Zorvec).

** Bruk korte intervaller (7 dager) ved høyt sykdomstrykk.

Behandlingsfrist

Behandlingsfristen er 7 dager før innhøsting.

Regnfasthet

Regnfast etter 20 minutter.

Ødelagt avling

Ingen påfølgende restriksjoner på avlinger.

Etterfølgende avlinger (normale rotasjoner)

Det er ingen restriksjoner på etterfølgende avlinger i en normal rotasjon.

Kompatibilitet/Blandingsbruk Det er viktig å merke seg at vurdering av preparatets effektivitet, samt risiko for helse og miljø er utført på preparatet alene, og ikke som en blanding med andre plantevernmidler.

Vannmengder

Zorvec Entecta påføres med traktormonterte hydrauliske sprøyter.

Påfør Zorvec Entecta i **20 til 40 liter vann per dekar**. Det laveste vannvolumet bør bare brukes i svært åpne avlinger. Ved senere påføring når avlingen er tett, skal sprøytevolumet økes til 30-40 liter vann per dekar.

Bruksvilkår som beskytter mennesker

Bruk vernehansker av nitril av god kvalitet og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Produktet må ikke benyttes nærmere enn 2 m fra områder tilgjengelig for fastboende og forbipasserende. Områder tilgjengelig for fastboende og forbipasserende er områder der personer kan oppholde seg som for eksempel veier, boliger, private hager og områder, institusjoner og offentlige arealer.

PÅFYLLING

Zorvec Entecta kan sprøytes ut med konvensjonell åkersprøyte. Preparatet kan fylles på direkt i tanken eller gjennom preparatpåfylleren. Hell i ønskede mengde av Zorvec Entecta i halvfull sprøyte med rent vann, sett på omrøring og hell deretter i resten av vannet. Omrøring skal være på under hele sprøytearbeidet.

Håndteringsfrist

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

Rengjøring

Merk! Spesziell skyllevannstank bør være av en størrelse som att sprøytevæskes tynnes ut 5 ganger.

Det er spesielt viktig å rengjøre alle innvendige detaljer. Aktiver alle slanger og ventiler samt øk trykket slik at overtrykksventil i det selvrensede filteret løses ut.

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettleidingen.

Deretter vaskes tanken innvendig med vann tilsatt rengjøringsmiddel, for eksempel All Clear¹ Extra. Bruk en vannmengde tilsvarende minst 10 % av tankvolumet. Start omrøring og sprøyt litt gjennom dysene. La resten stå i systemet minst 30 minutter. Start omrøring igjen og sprøyt alt vaskevannet ut gjennom dysene. Gjør dette minst 3-5 ganger. Siler og dyser skal tas ut og rengjøres spesielt godt med rengjøringsmiddel.

Skyll sprøyteutstyret med vann i 5 minutter og sprøy ut gjennom dyser og slanger på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med anbefalt vaskemiddel som All Clear Extra.

Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte rester av plantevernmiddel og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall. Det er forbudt å bruke tom emballasje til andre formål.

Lagring

Oppbevares frostfritt i lukket originalemballasjen.

¹Varemærke – FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT
INTENTIONALLY BLANK**

Zorvec Entecta™

SOPPMIDDEL

GROUP

49

21

FUNGICIDE

UFI: M9UA-XOV1-M00K-VXY3

Formulering:

SE - Suspensjon-emulsjon

Sammensetning: Amisulbrom

240 g/L+ Oxathiapiprolin 48 g/L

Reg. Nr.: 2024.25**Batchnummer og produksjonsdato:** se emballasjen.

Bland
godt før bruk,
manuelt eller
mekanisk

Holdbarhet: Minimum to års holdbarhet fra produksjonsdato ved korrekt lagring i uåpnet emballasje. Beskyttes mot frost. Temperatur ved lagring bør ikke overstige 40 °C.

Bland godt før bruk, manuelt eller mekanisk

Tilvirker: Corteva Agriscience

Registreringsholder: Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 København K - Danmark

Importør:

Felleskjøpet Agri, Depotgata 22,
2000 Lillestrøm tlf. 03520
Norgesfôr AS, Mail Boxes Etc. 367,
0028 Oslo, tlf. 22400700
Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6,
1531 Moss, tlf. 69204770

™ © Trademarks of Corteva
Agriscience and its
affiliated companies



290715

2410

NETTOINNHOLD:
5 L e