



# SUMIRODY® 10 FW

Fenpropatrin - emulsjon i vann

Til bekjempelse av skadedyr i gras, solbær, jordbær på friland, pryddplanter på friland og i veksthus samt tomat og agurk i veksthus.

Sammensetning: Fenpropatrin ..... 100 g/l  
Fenylxylyletan ..... 200 g/l  
Fyllstoffer ..... 700 g/l

A D V A R S E L

HELSESKADELIG

**Farlig ved svelging.  
Irriterer øynene og huden.  
OPPBEVARES UTILGJENGELIG  
FOR BARN.  
EKSTREMT GIFTIG FOR FISK.  
Må ikke brukes nærmere åpent  
vann enn 10 meter.  
Bruk egnet verneutstyr.  
Uskadeliggjør tomemballasjen.  
(Se forsiktighetsregler)**

**FARLIG FOR  
BIER**

**Forbuds å bruke  
på eller over  
blomstrende  
vegetasjon om  
dagen.**

## BEHANDLINGSFRIST:

Agurk og tomat: 4 dager  
Jorbær og gras: 14 dager  
Solbær: 42 dager

**Avgiftsklasse 3**

Tilvirker: Sumitomo Chemical Co. Ltd., Osaka, Japan

© Registrert varemerke: Sumitomo Chemical Co. Ltd. Osaka, Japan

Importør: DuPont Norge AS  
Postboks 727 Sentrum  
0105 Oslo  
tlf. 69 28 89 66



3 576960 023764

© Registrert varemerke: E.I. du Pont de Nemours & Co. (Inc.) USA

**REG.NR. 96.32.00 Nettoinnhold: 1 liter e**

**Det er forbudt å bruke Sumirody 10 FW i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.**

## BRUKSOMRÅDE

Sumirody 10 FW er tillatt brukt til bekjempelse av skadedyr i gras, solbær, jordbær på friland, pryddplanter på friland og i veksthus samt tomat og agurk i veksthus.

**Preparatet må ikke brukes på eller over blomstrende vegetasjon i den tid av døgnet som pollinerende insekter flyr, kl. 04.00 - 23.00 sommertid. Hvis temperaturen ikke overstiger 10°C, kan preparatet brukes fra kl. 22.00 - 06.00 sommertid.**

## VIKEMÅTE

Sumirody 10 FW er et insektmiddel med kontaktvirkning. Middelet har en raskt inaktiverende og senere dødelig virkning på de insekter som kommer i kontakt med sprøytevæsken eller behandlede plantedeler. Sumirody 10 FW bindes til plantenes vokslag og bark. Selv om det kommer store nedbørmengder etter at midlet har tørket inn, vaskes det ikke av. Sumirody 10 FW har avskrekkende (repellerende) virkning fra behandlede plantedeler. Det vil si at skadedyrene helst unngår å angripe plantedeler som er sprøytet.

## VIKEOMRÅDE

Sumirody 10 FW har god virkning mot veksthusspinnmidd, gallmidd, bladlus, veksthusmellus, minérflyer, gallmygg, trips og sommerfuglarver. Da Sumirody 10 FW har relativt lang virkningstid, er det en fordel å sprøyte allerede når angrepet begynner. Preparatet er skadelig overfor rovmidd og nytteinsekter.

## RESISTENS

Veksling med andre preparater bør skje på grunn av fare for resistens ved gjentatte sprøytinger.

## BRUKSMÅTE

Fyll tanken 3/4 med vann, start omrøring, tilsett Sumirody 10 FW og etterfyll med vann. Blandinger med andre plantevernmidler er lite aktuelt og frarådes.

## BRUKSRETLEDNING

### GRAS

Mot grasmidd, minérflye og bladlus.  
Dosering: 100 ml i 30-40 liter vann pr. dekar. Bruk 3-4 kg trykk for å få god dekning av gras. Sprøyt ved begynnelsen av angrep.

### JORDBÆR OG SOLBÆR

Mot veksthusspinnmidd, solbærgallmidd, solbærgallmygg og stikkelsebærpyralide.  
**Veksthusspinnmidd:** Bruk 90 ml i 120 l vann pr. dekar. Sprøyt ved begynnelsen av angrep.

**Solbærgallmidd og solbærgallmygg:** Bruk 100 ml i 120 l vann pr. dekar. Mot solbærgallmidd behandles ved begynnelsen av blomstring og 2 ganger til med 8-10 dagers mellomrom. Mot solbærgallmygg behandles ved begynnelsen av egglegging (vanligvis ved begynnelsen av blomstring).

**Stikkelsebærpyralide:** Bruk 100 ml i 120 l vann pr. dekar ved begynnelsen av blomstring eller i blomstringsperioden, men på den tiden av døgnet pollinerende insekter ikke flyr, se forsiktighetsregler. Vær nøye med å få dekket plantene.

## TOMAT OG AGURK I VEKSTHUS

Mot veksthusspinnmidd, bladlus (unntatt fosforresistent ferskenbladlus), veksthusmellus og minérflyer.

Bruk 7,5 ml/10 liter vann (0,075% oppløsning) til begynnelsen av angrep.

Sprøyt ved begynnelsen av angrep. Vær nøye med å få dekket plantene. Middelet kan ikke kombineres med biologisk bekjempelse med rovmidd eller andre nyttedyr.

## PRYDDPLANTER PÅ FRILAND OG I VEKSTHUS

Mot veksthusspinnmidd, bladlus (unntatt fosforresistent ferskenbladlus), skjoldlus, mellus, trips (unntatt amerikansk blomstertrips) og minérflyer.  
Bruk 7,5 ml/10 liter vann (0,075% oppløsning) til begynnelsen av angrep. Sprøyt ved begynnelsen av angrep og pass på å få dekket plantene godt. Ved behandling mot skjoldlus virker middelet mot de frie vandrelarvene og nyetablerete skjoldlus (1-3 mm lange).

## MERK PRYDDPLANTER

Sumirody 10 FW er brukt på en rekke kulturer. Ved behandling av ikke prøvde kulturer eller ikke prøvde utviklingstrinn bør alltid planter prøvesprøytes for å undersøke sortfølsomheten. Sprøyting på kulturer i blomst bør normalt unngås på grunn av faren for sviing. Unngå også behandling av roser med unge skudd. Sumirody 10 FW har vært i prøving i følgende kulturer uten skader: *Acalypha hispida*, *Chrysalidocarpus* (Areca), *Argyranthemum frutescens* (Margaret), *Asplenium nidus*, *Begonia*, *Beloperone*, *Bouvardia*, *Campanula isophylla*, *Catharanthus* (*Vincia*), *Cissus*, *Cyclamen*, *Dendranthema morifolium* (*Chrysanthemum*), *Dianthus*, *Dieffenbachia*, *Dracaena marginata*, *Euphorbia pulcherrima*, *Fatsia*, *Ficus benjamina*, *Ficus deltoidea*, *Ficus elastica* "rubusta", *Fuchsia*-hybrid, *Gerbera*-hybrid, *Guzmania*, *Hedera helix*, *Hibiscus rosa-sinensis*, *Hydrangea*, *Impatiens walleriana*, *Kalachoë*, *Howeia* (*Kentia*), *Maranta*, *Nerium oleander*, *Pelargonium*, *Philodendron*, *Phoenix*, *Rhododendron*, *Rosa*, *Saintpaulia*, *Schefflera*.

## FORSIKTIGHETSREGLER

Hansker, overtrekksklær, støvler og vernebriller bør brukes ved tillaging av sprøytevæske.  
Ved sprøyting bør det i tillegg brukes halvmaske med kombinasjonsfilter for støv og gass (P2, A1).  
Unngå innånding, hud- og øyekontakt med preparatet og sprøytetåke.  
Søl på hud og i øyne må straks vaskes av.  
Gjør rent sprøyteutstyret straks etter bruk.  
Preparatrest, ubenyttet sprøytevæske og skyllevann må ikke komme til fiskevann, drikkevann eller forurensning på annen måte.  
Grundig rengjort tomemballasje kan deponeres på offentlig søppelplass.

**Prod. år:**

## LAGRING

Oppbevares tørt og kjølig ved temperaturer over -5°C.

## MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaringer. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuelle skader.

700583111

