

BRUKSANVISNING (1)

Generelt:

VERTALEC inneholder sporer av en spesiell stamme av den insektpatogene soppen *Verticillium lecani* og er spesielt effektiv mot bladlus.

Virkemåte:

VERTALEC vil under optimale forhold drepe lus etter 7-10 dager. Etter sprøyting vil sporene spire og danne hyfer som trenger inn i kroppen til lusa og ødelegger vevet. Soppen vil deretter vokse ut av insektet og danne nye sporer som kan spres videre og infisere nye bladlus.

Klima:

Vellykket bruk av VERTALEC er avhengig av riktig luftfuktighet, temperatur og tidspunkt for behandling. VERTALEC krever minimum: 80 % Relativ fuktighet og en temperatur på 18°C.

Bruksområder:

- VERTALEC kan brukes til grønnsakkulturer som agurk, tomat og paprika og salat, pryddplanter som krysanthemum, gerbera, roser, julestjerner, ildtopp og fuksia. I tillegg er VERTALEC effektiv ved roting av stiklinger under plast.
Feil bruk kan gi skade på enkelte kulturer.

Bruksanvisning:

- Posens innhold røres godt ut i vann. La løsningen stå i 2-4 timer før bruk så sporene kan ta opp vann. Bruk 3-4 l vann med en temperatur på 15-20°C til 500 g VERTALEC. Blandingen må ikke utsettes for varme eller direkte sollys.
- Bruk rikelig med vann ved utsprøyting da dette fremmer spiring og vekst av soppen.
- Sprøyt helst sent på ettermiddagen for å få høyest mulig relativ fuktighet i kulturen. Sørg for å dekke bladundersiden og vekstpunktene godt under sprøytingen. Alle planter bør behandles.
- Sprøytevæsken skal være i omrøring under behandlingen.

Dosering: 1 gram pr. 1 vann (0,1 %)

- Til høye kulturer som tomat og agurk anbefales det å bruke 300 l ferdig blanding pr. 1000 m².
- Til lave kulturer anbefales det å bruke 150 l blanding pr. 1000 m².
- Til stiklinger anbefales det å bruke nok væske så stiklingene blir helt dekket.

Fortsetter på den andre siden

VERTALEC

VANNOPPLØSELIG PULVER

MIKROBIOLOGISK INSEKTMIDDEL

Mot bladlus i veksthusgrønnsaker og pryddplanter i veksthus

BRUKES KUN SOM INSEKTMIDDEL I HAGEBRUK

Sammensetning: *Verticillium lecanii* sporepulver ca. 40 % vol. vekt

ADVARSEL

Irriterer øynene

Unngå innånding av sprøytetåke

OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG

FOR BARN

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler)

Uskadelig tomemballasjen (se avfallshåndtering)



IRRITERENDE

Avgiftsklasse 1

De er forbudt å bruke VERTALEC i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Behandlingsfrist: 4 dager.

Produsent:

Koppert B.V., Nederland
P.O.Box 155
NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Importør:

L.O.G. S/L
Boks 141 Økern
0509 Oslo

MYCOTAL er registrert varemerke av Koppert B.V.

Holdbarhet: Se toppen av pakningen

REG.NR.: 98.29.99 **Nettoinnhold: 500 g**

BRUKSANVISNING (2)

Tidspunkt:

VERTALEC skal brukes tidlig i kulturen mens antall lus er lavt. Gjenta behandlingen med 4-7 dagers intervall inntil bladlusangrepet er under kontroll.

Integret bruk med biologisk bekjempelse:

VERTALEC kan brukes sammen med nytteinsekter til bruk i biologisk bekjempelse.

Integret bekjempelse med kjemisk plantevern:

Selektiv bruk av kjemisk plantevern er mulig med VERTALEC under følgende betingelser:

- Blandes aldri sammen med VERTALEC i sprøyten.
- Soppmidler kan brukes inntil 3 dager før behandling eller mer enn 3 dager etter behandling med VERTALEC.
- Bruk aldri kjemiske midler som inneholder de aktive stoffene: azinphos-methyl, foksim, kinometionat, mancozeb, penkonazol, prochloraz, svovel, tolylfuanid, triforin.

Lagring:

Lagres lufttett i originalemballasje i kjøleskap ved 2-6°C. Bør ikke lagres sammen med spiselige produkter. Må ikke utsettes for frost.

Merk:

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Forsiktighetsregler:

Bruk egnede vernemasker, øyevern og egnet arbeidstøy ved tillaging av sprøytevæske og ved sprøyting. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes. Ved tåkesprøyting skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann. Ved uhell kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Rengjøring:

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettledningen. Skyll sprøytestyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Avfallshåndtering:

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrert plantevernmidlerester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.