

ALAR® 85


Daminozid vannløselig pulver
Til vekstregulering i prydplanter

SAMMENSETNING:

Daminozid 850 g/kg
Fyllstoffer 150 g/kg

ADVARSEL

Mulig fare for kreft.
Irriterer øynene.
Unngå innånding av sprøytetåke.
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Bruk egnet verneutstyr (Se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen
(se avfallshåndtering)



HELSEKADELIG

Tilvirker:
Uniroyal Chemical Co. Inc.,
Cinnecticut U.S.A.

Avgiftsklasse 3

AV Varenr.: 6164

Reg. nr.: 99.19.99

Nettoinnhold: 1 kg e

Importer:

Agrovekst

Agrovekst Produkter AS
Huggenes Gård, 1581 Rygge

Det er forbudt å bruke Alar 85 i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist og å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

BRUKSOMRÅDE

Alar 85 er tillatt brukt til vekstregulering av prydplanter.

Virkning

Alar hemmer strekningsveksten og gir plantene en mer kompakt vokseform.

BRUKSRETTLING

Vanlig dosering er 30-60 g til 10 liter vann. Som veiledning kan følgende angis:

Plante	Mengde til 10l vann	Behandlingstid etc.
Achimenes	30-60	2 uker etter topping.
Ageratum	30-60	Ca. 50 dager etter såing eller 2-4 uker etter topping.
Browallia	30	2-3 ganger, første gang ved 2-3 cm lange skudd etter topping.
Campanula	15-60	Når skuddene har nådd potteskanten og 10-12 dager senere.
Chrysanthem.	30	10-14 dager etter topping og 1-2 ganger senere med en ukes mellomrom.
Columnnea	30	Ca. en uke før en ønsker å se virkning.
Crossandra	35	Ved 5 cm lange skudd og 3 uker senere.
Dahlia	30-60	Når plantene er 10-12 cm lange og eventuelt en gang til (Sterkt voksende). 10 dager senere.
Fuchsia	30-40	Når skuddene er 1-2 cm lange etter topping og 2 uker senere.
Hydrangea (Hortensia)	35-60	2-3 uker etter drivingsstart.
Kalanchoe	30-60	Ved 2-3 cm lange skudd etter topping og deretter hver uke om sommeren og annenhver uke om vinteren.
Petunia	60-120	Første gang straks hovedskuddet begynner å strekke seg. 1-5 sprøytinger avhengig av sort og vekst i plantene.
Rhododendron (Asalea)	25	5-6 uker etter topping og 10 dager senere.
Senecio (Sineraria)	15-30	Når blomsterknoppene er synlige.
Salvia	30-60	4-5 uker etter såing.
Solanium	20-60	1-2 ganger med 2 ukers mellomrom i prikkekassa.
Tagetes	35-60	4-5 uker etter såing.
Verbena	60	Ca. en uke før en ønsker å se virkning.

Doseringsmengde og antall behandlinger må nøye avpasses etter dyrkingstemperatur og vann-/fuktighetsforhold under kulturriden. Før sprøyting skal jorda være oppfuktet og bladene tørre. Virkningen er best ved bruk av rikelig væske. Sprøyt derfor til dryppunktet i skyet vær, eller om kvelden. Ikke vann eller brus før 24 timer etter behandling. Alar er ikke prøvd i alle arter og sorter. Ved manglende erfaring bør en prøvesprøyte noen få planter før et større antall behandles.

Blanding med andre midler.

Bland ikke med andre kjemikalier.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av neopren, øyevern og overtrekksdress samt forkl av neopren ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal overtrekksdress og halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 S og L brukes. Før man stoffet i øynene skylles grundig med store mengder vann og kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00. Ved svelging må ikke brekninger fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etiketten eller emballasjen. Søl av preparatet på huden må straks skylles eller vaskes av. Klær tilsatt med preparatet må fjernes straks. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Vask klærne når arbeidet er ferdig. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00. Anbefalt verneutstyr må benyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på minst 24 timer etter sprøyting. Hansker bør benyttes utover denne perioden.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag tre ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettlingsregler. Skylle sprøytetanket med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Avfallshåndtering

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernmidlerester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

Lagring

Alar kan lagres i pulverform. Løst i vann blir preparatet fort uvrirksomt. Hvis det ved bruk av preparatet under særlige forhold skulle oppstå skader, kan selgeren ikke gjøres ansvarlig for disse.

Produksjonsår: Se separat merking på produkt.