Confidor® 70 WG

Imidakloprid vanndispergerbart granulat

Mot biller, bladlus, mellus, skjoldlus, trips, ullus m. fl. i agurk, kinakål, paprika, salat, tomat, oppal av grønnsaker, krydderurter og prydvekster i drivbenker og veksthus.

Sammensetning:

Imidakloprid: . . . . . 700 g/kg
Sprede- og fyllstoffer: . . . . . 300 g/kg

ADVARSEL

Farlig ved svelging
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallhåndtering)

FARLIG FOR BIER

Forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon

HELSESKADELIG

Avgiftsklasse 2

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika:	4 dager
Salat:	7 dager
Øvrige spiselige vekster:	14 dager

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

Bayer

Netto 200 g

REG.NR. 99.24.99

7 038090 391138

Det er forbudt å bruke Confidor 70 WG i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde Confidor 70 WG er tillatt brukt i agurk, kinakål, paprika, salat, tomat, oppal av grønnsaker, krydderurter *(Allium, Anthriscus, Anethum, Artemisia, Borago, Carum, Coriandrum, Hyssopus, Levisticum, Melissa, Mentha, Monarda, Myrris, Nasturtium, Ocimum, Origanum, Petroselium, Rosmarinus, Rumex, Salvia, Satureja og Thymus)* og prydvekster i drivbenker og veksthus.

Virkeområde Confidor har meget god virkning mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmellus og bomullsmellus (voksne og små nymfer). Confidor virker også mot biller, jordlopper, minérmøll, sikader, sugere, trips m. fl. Virkningen mot amerikansk blomstertrips *(Frankliniella occidentalis)* er usikker. Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistent mot Confidor. Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst av resistente insektpopulasjoner kan ikke forutsies. For å forebygge resistens, bør Confidor brukes i veksling med andre insektmidler med en annen virkningsmekanisme enn imidakloprid. Resistens hos enkelte populasjoner av bomullsmellus er påvist i utlandet.

Virkemåte Confidor virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten. Confidor er spesielt godt egnet til bekjempelse av insekter som lever skjult på/i plantene. Overfor insektene har Confidor kontakt- og magevirkning, og virker raskt. God vekst i plantene er en forutsetning for rask opptak og god virkning.

Skånsomhet Confidor er skånsom overfor egg hos rovmiddene *Phytoseiulus persmilis, Amblyseius californicus, Amblyseius cucumeris* og *Hypoaspis miles*. Confidor skader ved direkte sprøyting bladlusgallmygg, bladlussnylteveps, gulløye, mellussnylteveps, marihøner, rovteger og nymfer og voksne rovmidd. Som følge av at Confidor er systemisk og har raskt opptak til plantene, vil preparatet i liten grad påvirke nytteinsekter som settes inn etter behandling, og er således egnet i systemer med biologisk insektkontroll. Ettervirkning er 0 – 4 uker. Confidor har vært prøvd i snittgerbera, krysantemum, salat, paprika og tomat uten at skade er rapportert. På grunn av skiftende kulturbetingelser, og da ulike sorter og arter kan reagere forskjellig, anbefales prøvesprøyting på enkeltplanter før generell bekjempelse.

Blandbarhet Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre virkningsmessig, men kan også føre til effekter som ikke er avdekket i forsøk. Eventuelle blandinger gjøres på brukerens eget ansvar.

Forsiktighetsregler Bruk egnede vernehansker (fortrinnsvis av polykloropren) og egnet arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann. Kontakt lege om nødvendig. Søl på hud eller klær må skylles eller vaskes av. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Vask klærne når arbeidet er ferdig. Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting. Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Bruksrettledning *Tillaging:* Fyll halvparten av beregnet vanmmengde i sprøyten. Tilsett beregnet mengde Confidor, og fyll etter med vann til beregnet volum sprøytevæske.

Sprøyteteknikk: Dose og væskemengde er oppgitt pr. dekar dyrkningsareal med en normal plantehøyde (oppgitt i parentes) og med moderat dråpestørrelse i sprøytedusjen. Ved avvik fra oppgitt normal plantehøyde, endres dose og væskemengde tilsvarende. Alternativt kan det sprøytes til det drypper fra planten.

		Lave planter	Middels høye planter (ca. 50 cm)	Høye planter og prydbusker (ca. 1 m)
Mot bladlus	Sprøyt så snart de første bladlusene vises. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 10-14 dager avhengig av angrepsgrad og vekst-intensitet.	Confidor: 15g Væske-mengde: ca. 50 liter.	Confidor: 20g Væske-mengde: ca. 70 liter.	Confidor: 25g Væske-mengde: ca. 100 liter.
Mot biller, blodlus, jordlopper, mellus, minérmøll, sikader, skjoldlus, sugere, trips, ullus m. fl.	Sprøyt så snart de første skadeinsektene vises. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 10-14 dager avhengig av angrepsgrad og vekst-intensitet.	Confidor: 20g Væske-mengde: ca. 50 liter.	Confidor: 25g Væske-mengde: ca. 70 liter	Confidor: 35g Væske-mengde: ca. 100 liter

Rengjøring Tomemballasje skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes minst 5 ganger med vann og sprøytes ut i h. h. t. bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med salmiakk, soda eller annet egnet vaskemiddel. Tilsølte klær skiftes og vaskes.

Avfallshåndtering Grundig rengjort tomemballasje kan leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

Lagring Tørt og kjølig

Merk Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

7 038090 391138

Netto 200 g

Bayer

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

REG.NR. 99.24.99

Avgiftsklasse 2

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika:	4 dager
Salat:	7 dager
Øvrige spiselige vekster:	14 dager

ADVARSEL

Farlig ved svelging
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallhåndtering)

FARLIG FOR BIER

Forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon

HELSESKADELIG

Mot biller, bladlus, mellus, skjoldlus, trips, ullus m. fl. i agurk, kinakål, paprika, salat, tomat, oppal av grønnsaker, krydderurter og prydvekster i drivbenker og veksthus.

Sammensetning:

Imidakloprid: . . . . . 700 g/kg
Sprede- og fyllstoffer: . . . . . 300 g/kg

ADVARSEL

Farlig ved svelging
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallhåndtering)

FARLIG FOR BIER

Forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon

HELSESKADELIG

Avgiftsklasse 2

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika:	4 dager
Salat:	7 dager
Øvrige spiselige vekster:	14 dager

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

Bayer

Netto 200 g

REG.NR. 99.24.99

7 038090 391138

Det er forbudt å bruke Confidor 70 WG i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde Confidor 70 WG er tillatt brukt i agurk, kinakål, paprika, salat, tomat, oppal av grønnsaker, krydderurter *(Allium, Anthriscus, Anethum, Artemisia, Borago, Carum, Coriandrum, Hyssopus, Levisticum, Melissa, Mentha, Monarda, Myrris, Nasturtium, Ocimum, Origanum, Petroselium, Rosmarinus, Rumex, Salvia, Satureja og Thymus)* og prydvekster i drivbenker og veksthus.

Virkeområde Confidor har meget god virkning mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmellus og bomullsmellus (voksne og små nymfer). Confidor virker også mot biller, jordlopper, minérmøll, sikader, sugere, trips m. fl. Virkningen mot amerikansk blomstertrips *(Frankliniella occidentalis)* er usikker. Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistent mot Confidor. Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst av resistente insektpopulasjoner kan ikke forutsies. For å forebygge resistens, bør Confidor brukes i veksling med andre insektmidler med en annen virkningsmekanisme enn imidakloprid. Resistens hos enkelte populasjoner av bomullsmellus er påvist i utlandet.

Virkemåte Confidor virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten. Confidor er spesielt godt egnet til bekjempelse av insekter som lever skjult på/i plantene. Overfor insektene har Confidor kontakt- og magevirkning, og virker raskt. God vekst i plantene er en forutsetning for rask opptak og god virkning.

Skånsomhet Confidor er skånsom overfor egg hos rovmiddene *Phytoseiulus persmilis, Amblyseius californicus, Amblyseius cucumeris* og *Hypoaspis miles*. Confidor skader ved direkte sprøyting bladlusgallmygg, bladlussnylteveps, gulløye, mellussnylteveps, marihøner, rovteger og nymfer og voksne rovmidd. Som følge av at Confidor er systemisk og har raskt opptak til plantene, vil preparatet i liten grad påvirke nytteinsekter som settes inn etter behandling, og er således egnet i systemer med biologisk insektkontroll. Ettervirkning er 0 – 4 uker. Confidor har vært prøvd i snittgerbera, krysantemum, salat, paprika og tomat uten at skade er rapportert. På grunn av skiftende kulturbetingelser, og da ulike sorter og arter kan reagere forskjellig, anbefales prøvesprøyting på enkeltplanter før generell bekjempelse.

Blandbarhet Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre virkningsmessig, men kan også føre til effekter som ikke er avdekket i forsøk. Eventuelle blandinger gjøres på brukerens eget ansvar.

Forsiktighetsregler Bruk egnede vernehansker (fortrinnsvis av polykloropren) og egnet arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann. Kontakt lege om nødvendig. Søl på hud eller klær må skylles eller vaskes av. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Vask klærne når arbeidet er ferdig. Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting. Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Bruksrettledning *Tillaging:* Fyll halvparten av beregnet vanmmengde i sprøyten. Tilsett beregnet mengde Confidor, og fyll etter med vann til beregnet volum sprøytevæske.

Sprøyteteknikk: Dose og væskemengde er oppgitt pr. dekar dyrkningsareal med en normal plantehøyde (oppgitt i parentes) og med moderat dråpestørrelse i sprøytedusjen. Ved avvik fra oppgitt normal plantehøyde, endres dose og væskemengde tilsvarende. Alternativt kan det sprøytes til det drypper fra planten.

		Lave planter	Middels høye planter (ca. 50 cm)	Høye planter og prydbusker (ca. 1 m)
Mot bladlus	Sprøyt så snart de første bladlusene vises. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 10-14 dager avhengig av angrepsgrad og vekst-intensitet.	Confidor: 15g Væske-mengde: ca. 50 liter.	Confidor: 20g Væske-mengde: ca. 70 liter.	Confidor: 25g Væske-mengde: ca. 100 liter.
Mot biller, blodlus, jordlopper, mellus, minérmøll, sikader, skjoldlus, sugere, trips, ullus m. fl.	Sprøyt så snart de første skadeinsektene vises. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 10-14 dager avhengig av angrepsgrad og vekst-intensitet.	Confidor: 20g Væske-mengde: ca. 50 liter.	Confidor: 25g Væske-mengde: ca. 70 liter	Confidor: 35g Væske-mengde: ca. 100 liter

Rengjøring Tomemballasje skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes minst 5 ganger med vann og sprøytes ut i h. h. t. bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med salmiakk, soda eller annet egnet vaskemiddel. Tilsølte klær skiftes og vaskes.

Avfallshåndtering Grundig rengjort tomemballasje kan leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

Lagring Tørt og kjølig

Merk Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

7 038090 391138

Netto 200 g

Bayer

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

REG.NR. 99.24.99

Avgiftsklasse 2

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika:	4 dager
Salat:	7 dager
Øvrige spiselige vekster:	14 dager

ADVARSEL

Farlig ved svelging
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallhåndtering)

FARLIG FOR BIER

Forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon

HELSESKADELIG

Mot biller, bladlus, mellus, skjoldlus, trips, ullus m. fl. i agurk, kinakål, paprika, salat, tomat, oppal av grønnsaker, krydderurter og prydvekster i drivbenker og veksthus.

Sammensetning:

Imidakloprid: . . . . . 700 g/kg
Sprede- og fyllstoffer: . . . . . 300 g/kg

ADVARSEL

Farlig ved svelging
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallhåndtering)

FARLIG FOR BIER

Forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon

HELSESKADELIG

Avgiftsklasse 2

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika:	4 dager
Salat:	7 dager
Øvrige spiselige vekster:	14 dager

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

Bayer

Netto 200 g

REG.NR. 99.24.99

7 038090 391138

Det er forbudt å bruke Confidor 70 WG i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde Confidor 70 WG er tillatt brukt i agurk, kinakål, paprika, salat, tomat, oppal av grønnsaker, krydderurter *(Allium, Anthriscus, Anethum, Artemisia, Borago, Carum, Coriandrum, Hyssopus, Levisticum, Melissa, Mentha, Monarda, Myrris, Nasturtium, Ocimum, Origanum, Petroselium, Rosmarinus, Rumex, Salvia, Satureja og Thymus)* og prydvekster i drivbenker og veksthus.

Virkeområde Confidor har meget god virkning mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmellus og bomullsmellus (voksne og små nymfer). Confidor virker også mot biller, jordlopper, minérmøll, sikader, sugere, trips m. fl. Virkningen mot amerikansk blomstertrips *(Frankliniella occidentalis)* er usikker. Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistent mot Confidor. Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst av resistente insektpopulasjoner kan ikke forutsies. For å forebygge resistens, bør Confidor brukes i veksling med andre insektmidler med en annen virkningsmekanisme enn imidakloprid. Resistens hos enkelte populasjoner av bomullsmellus er påvist i utlandet.

Virkemåte Confidor virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten. Confidor er spesielt godt egnet til bekjempelse av insekter som lever skjult på/i plantene. Overfor insektene har Confidor kontakt- og magevirkning, og virker raskt. God vekst i plantene er en forutsetning for raskt opptak og god virkning.

Skånsomhet Confidor er skånsom overfor egg hos rovmiddene *Phytoseiulus persmilis, Amblyseius californicus, Amblyseius cucumeris* og *Hypoaspis miles*. Confidor skader ved direkte sprøyting bladlusgallmygg, bladlussnylteveps, gulløye, mellussnylteveps, marihøner, rovteger og nymfer og voksne rovmidd. Som følge av at Confidor er systemisk og har raskt opptak til plantene, vil preparatet i liten grad påvirke nytteinsekter som settes inn etter behandling, og er således egnet i systemer med biologisk insektkontroll. Ettervirkning er 0 – 4 uker. Confidor har vært prøvd i snittgerbera, krysantemum, salat, paprika og tomat uten at skade er rapportert. På grunn av skiftende kulturbetingelser, og da ulike sorter og arter kan reagere forskjellig, anbefales prøvesprøyting på enkeltplanter før generell bekjempelse.

Blandbarhet Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre virkningsmessig, men kan også føre til effekter som ikke er avdekket i forsøk. Eventuelle blandinger gjøres på brukerens eget ansvar.

Forsiktighetsregler Bruk egnede vernehansker (fortrinnsvis av polykloropren) og egnet arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann. Kontakt lege om nødvendig. Søl på hud eller klær må skylles eller vaskes av. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Vask klærne når arbeidet er ferdig. Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting. Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Bruksrettledning *Tillaging:* Fyll halvparten av beregnet vanmmengde i sprøyten. Tilsett beregnet mengde Confidor, og fyll etter med vann til beregnet volum sprøyteväske.

Sprøyteteknikk: Dose og væskemengde er oppgitt pr. dekar dyrkningsareal med en normal plantehøyde (oppgitt i parentes) og med moderat dråpestørrelse i sprøytedusjen. Ved avvik fra oppgitt normal plantehøyde, endres dose og væskemengde tilsvarende. Alternativt kan det sprøytes til det drypper fra planten.

		Lave planter	Middels høye planter (ca. 50 cm)	Høye planter og prydbusker (ca. 1 m)
Mot bladlus	Sprøyt så snart de første bladlusene vises. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 10-14 dager avhengig av angrepsgrad og vekst-intensitet.	Confidor: 15g Väske-mengde: ca. 50 liter.	Confidor: 20g Väske-mengde: ca. 70 liter.	Confidor: 25g Väske-mengde: ca. 100 liter.
Mot biller, blodlus, jordlopper, mellus, minérmøll, sikader, skjoldlus, sugere, trips, ullus m. fl.	Sprøyt så snart de første skadeinsektene vises. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 10-14 dager avhengig av angrepsgrad og vekst-intensitet.	Confidor: 20g Väske-mengde: ca. 50 liter.	Confidor: 25g Väske-mengde: ca. 70 liter	Confidor: 35g Väske-mengde: ca. 100 liter

Rengjøring Tomemballasje skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes minst 5 ganger med vann og sprøytes ut i h. h. t. bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med salmiakk, soda eller annet egnet vaskemiddel. Tilsølte klær skiftes og vaskes.

Avfallshåndtering Grundig rengjort tomemballasje kan leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

Lagring Tørt og kjølig

Merk Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

7 038090 391138

Netto 200 g

Bayer

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

REG.NR. 99.24.99

Avgiftsklasse 2

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika:	4 dager
Salat:	7 dager
Øvrige spiselige vekster:	14 dager

ADVARSEL

Farlig ved svelging
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallhåndtering)

FARLIG FOR BIER

Forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon

HELSESKADELIG

Mot biller, bladlus, mellus, skjoldlus, trips, ullus m. fl. i agurk, kinakål, paprika, salat, tomat, oppal av grønnsaker, krydderurter og prydvekster i drivbenker og veksthus.

Sammensetning:

Imidakloprid: . . . . . 700 g/kg
Sprede- og fyllstoffer: . . . . . 300 g/kg

ADVARSEL

Farlig ved svelging
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallhåndtering)

FARLIG FOR BIER

Forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon

HELSESKADELIG

Avgiftsklasse 2

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika:	4 dager
Salat:	7 dager
Øvrige spiselige vekster:	14 dager

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

Bayer

Netto 200 g

REG.NR. 99.24.99

7 038090 391138

Det er forbudt å bruke Confidor 70 WG i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde Confidor 70 WG er tillatt brukt i agurk, kinakål, paprika, salat, tomat, oppal av grønnsaker, krydderurter *(Allium, Anthriscus, Anethum, Artemisia, Borago, Carum, Coriandrum, Hyssopus, Levisticum, Melissa, Mentha, Monarda, Myrris, Nasturtium, Ocimum, Origanum, Petroselium, Rosmarinus, Rumex, Salvia, Satureja og Thymus)* og prydvekster i drivbenker og veksthus.

Virkeområde Confidor har meget god virkning mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmellus og bomullsmellus (voksne og små nymfer). Confidor virker også mot biller, jordlopper, minérmøll, sikader, sugere, trips m. fl. Virkningen mot amerikansk blomstertrips *(Frankliniella occidentalis)* er usikker. Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistent mot Confidor. Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst av resistente insektpopulasjoner kan ikke forutsies. For å forebygge resistens, bør Confidor brukes i veksling med andre insektmidler med en annen virkningsmekanisme enn imidakloprid. Resistens hos enkelte populasjoner av bomullsmellus er påvist i utlandet.

Virkemåte Confidor virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten. Confidor er spesielt godt egnet til bekjempelse av insekter som lever skjult på/i plantene. Overfor insektene har Confidor kontakt- og magevirkning, og virker raskt. God vekst i plantene er en forutsetning for raskt opptak og god virkning.

Skånsomhet Confidor er skånsom overfor egg hos rovmiddene *Phytoseiulus persmilis, Amblyseius californicus, Amblyseius cucumeris* og *Hypoaspis miles*. Confidor skader ved direkte sprøyting bladlusgallmygg, bladlussnylteveps, gulløye, mellussnylteveps, marihøner, rovteger og nymfer og voksne rovmidd. Som følge av at Confidor er systemisk og har raskt opptak til plantene, vil preparatet i liten grad påvirke nytteinsekter som settes inn etter behandling, og er således egnet i systemer med biologisk insektkontroll. Ettervirkning er 0 – 4 uker. Confidor har vært prøvd i snittgerbera, krysantemum, salat, paprika og tomat uten at skade er rapportert. På grunn av skiftende kulturbetingelser, og da ulike sorter og arter kan reagere forskjellig, anbefales prøvesprøyting på enkeltplanter før generell bekjempelse.

Blandbarhet Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre virkningsmessig, men kan også føre til effekter som ikke er avdekket i forsøk. Eventuelle blandinger gjøres på brukerens eget ansvar.

Forsiktighetsregler Bruk egnede vernehansker (fortrinnsvis av polykloropren) og egnet arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P2 S og L brukes. Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann. Kontakt lege om nødvendig. Søl på hud eller klær må skylles eller vaskes av. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Vask klærne når arbeidet er ferdig. Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på inntil 24 timer etter sprøyting. Ved uhell eller mistanke om forgiftning, kontakt lege eller Giftinformasjonssentralen tlf. 22 59 13 00 (åpent hele døgnet).

Bruksrettledning *Tillaging:* Fyll halvparten av beregnet vanmmengde i sprøyten. Tilsett beregnet mengde Confidor, og fyll etter med vann til beregnet volum sprøyteväske.

Sprøyteteknikk: Dose og væskemengde er oppgitt pr. dekar dyrkningsareal med en normal plantehøyde (oppgitt i parentes) og med moderat dråpestørrelse i sprøytedusjen. Ved avvik fra oppgitt normal plantehøyde, endres dose og væskemengde tilsvarende. Alternativt kan det sprøytes til det drypper fra planten.

		Lave planter	Middels høye planter (ca. 50 cm)	Høye planter og prydbusker (ca. 1 m)
Mot bladlus	Sprøyt så snart de første bladlusene vises. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 10-14 dager avhengig av angrepsgrad og vekst-intensitet.	Confidor: 15g Väske-mengde: ca. 50 liter.	Confidor: 20g Väske-mengde: ca. 70 liter.	Confidor: 25g Väske-mengde: ca. 100 liter.
Mot biller, blodlus, jordlopper, mellus, minérmøll, sikader, skjoldlus, sugere, trips, ullus m. fl.	Sprøyt så snart de første skadeinsektene vises. Gjenta behandlingen om nødvendig etter 10-14 dager avhengig av angrepsgrad og vekst-intensitet.	Confidor: 20g Väske-mengde: ca. 50 liter.	Confidor: 25g Väske-mengde: ca. 70 liter	Confidor: 35g Väske-mengde: ca. 100 liter

Rengjøring Tomemballasje skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes minst 5 ganger med vann og sprøytes ut i h. h. t. bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med salmiakk, soda eller annet egnet vaskemiddel. Tilsølte klær skiftes og vaskes.

Avfallshåndtering Grundig rengjort tomemballasje kan leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass. Konsentrerte plantevernrester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for spesialavfall.

Lagring Tørt og kjølig

Merk Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

7 038090 391138

Netto 200 g

Bayer

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

REG.NR. 99.24.99

Avgiftsklasse 2

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika:	4 dager
Salat:	7 dager
Øvrige spiselige vekster:	14 dager

ADVARSEL

Farlig ved svelging
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallhåndtering)

FARLIG FOR BIER

Forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon

HELSESKADELIG

Mot biller, bladlus, mellus, skjoldlus, trips, ullus m. fl. i agurk, kinakål, paprika, salat, tomat, oppal av grønnsaker, krydderurter og prydvekster i drivbenker og veksthus.

Sammensetning:

Imidakloprid: . . . . . 700 g/kg
Sprede- og fyllstoffer: . . . . . 300 g/kg

ADVARSEL

Farlig ved svelging
Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn
Giftig for vannlevende organismer
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsreglene)
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallhåndtering)

FARLIG FOR BIER

Forbudt å bruke på eller over blomstrende vegetasjon

HELSESKADELIG

Avgiftsklasse 2

Behandlingsfrist:

Tomat, agurk, paprika:	4 dager
Salat:	7 dager
Øvrige spiselige vekster:	14 dager

Importør: Bayer AS
Tilvirker: Bayer AG, Leverkusen

Bayer

Netto 200 g

REG.NR. 99.24.99

7 038090 391138

Det er forbudt å bruke Confidor 70 WG i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Bruksområde Confidor 70 WG er tillatt brukt i agurk, kinakål, paprika, salat, tomat, oppal av grønnsaker, krydderurter *(Allium, Anthriscus, Anethum, Artemisia, Borago, Carum, Coriandrum, Hyssopus, Levisticum, Melissa, Mentha, Monarda, Myrris, Nasturtium, Ocimum, Origanum, Petroselium, Rosmarinus, Rumex, Salvia, Satureja og Thymus)* og prydvekster i drivbenker og veksthus.

Virkeområde Confidor har meget god virkning mot bladlus, blodlus, skjoldlus, ullus, veksthusmellus og bomullsmellus (voksne og små nymfer). Confidor virker også mot biller, jordlopper, minérmøll, sikader, sugere, trips m. fl. Virkningen mot amerikansk blomstertrips *(Frankliniella occidentalis)* er usikker. Det kan ikke utelukkes at det opptrer insektpopulasjoner som er resistent mot Confidor. Dette kan føre til redusert virkning. Eventuell forekomst av resistente insektpopulasjoner kan ikke forutsies. For å forebygge resistens, bør Confidor brukes i veksling med andre insektmidler med en annen virkningsmekanisme enn imidakloprid. Resistens hos enkelte populasjoner av bomullsmellus er påvist i utlandet.

Virkemåte Confidor virker systemisk og transporteres med plantesaften utover i planten. Confidor er spesielt godt egnet til bekjempelse av insekter som lever skjult på/i plantene. Overfor insektene har Confidor kontakt- og magevirkning, og virker raskt. God vekst i plantene er en forutsetning for raskt opptak og god virkning.

Skånsomhet Confidor er skånsom overfor egg hos rovmiddene *Phytoseiulus persmilis, Amblyseius californicus, Amblyseius cucumeris* og *Hypoaspis miles*. Confidor skader ved direkte sprøyting bladlusgallmygg, bladlussnylteveps, gulløye, mellussnylteveps, marihøner, rovteger og nymfer og voksne rovmidd. Som følge av at Confidor er systemisk og har raskt opptak til plantene, vil preparatet i liten grad påvirke nytteinsekter som settes inn etter behandling, og er således egnet i systemer med biologisk insektkontroll. Ettervirkning er 0 – 4 uker. Confidor har vært prøvd i snittgerbera, krysantemum, salat, paprika og tomat uten at skade er rapportert. På grunn av skiftende kulturbetingelser, og da ulike sorter og arter kan reagere forskjellig, anbefales prøvesprøyting på enkeltplanter før generell bekjempelse.

Blandbarhet Blanding av preparater er utprøvd i begrenset grad. Preparater i blanding kan utfylle hverandre virkningsmessig, men kan også føre til effekter som ikke er avdekket i forsøk. Eventuelle blandinger gjøres på brukerens eget ansvar.

Forsiktighetsregler Bruk egnede vernehansker (fortrinnsvis av polykloropren) og egnet arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er