

PIRIMOR®

Insektmiddel

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus



ADAMA

Sammensetning: Pirimikarb 500 g/kg (50% w/w)
Formulering: vannløselig granulat (WG)
Registreringsnummer: 2011.19.19
Avgiftsklasse: 2
Virkmåte: IRAC gruppe 1A

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen
Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdato

Innehaver av godkjenning:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederland
www.adama.com


Tilvirker:
Syngenta Crop Protection AG
CH-4002 Basel
Sveits

Importør:
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

*ADAMA Celsius B.V., Curacao Branch

1 KG e

ANEPRMN01KG/03/A

Productname	Pirimor®		
Country	Norway		
Package size	1 Kg		
Label code	ANEPRMN01KG/03/A		
Label dimensions	100 x 128 (h x w)	Name	Saskia de Kruijf
Label date	03/12/2020	Version	01



PIRIMOR®

Insektmiddel



FARE

Giftig ved svelging • Gir alvorlig øyeirritasjon • Farlig ved innånding • Mistenkes for å kunne forårsake kreft • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann • Giftig for bier og andre insekter • Inneholder Pirimikarb. Kan gi en allergisk reaksjon • Unngå innånding av aerosoler • Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet • VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter • Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen • Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Les alltid etiketten nøye før bruk



ANEPRMNO1KG/03/B

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområder eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.



8 718077 01284 1

UN 2588



NORWAY

Productname	Pirimor®		
Country	Norway		
Package size	1 Kg		
Label code	ANEPRMNO1KG/03/B		
Label dimensions	100 x 128 (hxw)	Name	Saskia de Kruijf
Label date	03/12/2020	Version	APPROVED



PIRIMOR®

Insektmiddel



Åpnes her



FARE

Giftig ved svelging • Gir alvorlig øyeirritasjon • Førlig ved innånding • Mistenkes for å kunne forårsake kreft • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann • Giftig for bier og andre insekter • Inneholder Pirimikarb. Kan gi en allergisk reaksjon • Unngå innånding av aerosoler • Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet •

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter • Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen • Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Les alltid etiketten nøye før bruk



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.



8 718077 012841

UN 2588



NORWAY

RISIKO, FORSIKTIGHETSREGLER
OG FØRSTEHJELP

ANEPRMNO5KG/03/B

BRUK OG DOSERING

Productname	Pirimor®			
Country	Norway			
Package size	1 Kg			
Label code	ANEPRMNO5KG/03/B			
Label dimensions	100 x 128 (hwxw)	Name	Saskia de Kruijf	
Label date	03/12/2020	Version	APPROVED	



BRUKSRETLEDNING

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus.

Vekst	Skadegørere	Behandlingstid	Konsentrasjon	Maks arealdose	Normal vaskemengde	Behandlinger	Dager mellom behandlinger	Behandlingsfrist, dager
Tomat, agurk og paprika i veksthus	Bladlus	Ved begynnende angrep	50 g Pirimor® pr. 100 liter vann	75 g per behandling per 1000 m ² nettoareal	Bruk 60-200 liter vann per 1000 m ² nettoareal. Brukes mer enn 150 liter vann per 1000 m ² nettoareal må konsentrasjonen reduseres så ikke maks arealdose overskrides	1-2	7	4
Salat og krydderurter i veksthus	Bladlus	Ved begynnende angrep	50 g Pirimor® pr. 100 liter vann	50 g per behandling per 1000 m ² nettoareal	Bruk 50-100 liter vann per 1000 m ² nettoareal	1-2	7	10
Jordbær i veksthus	Bladlus	Ved begynnende angrep	50 g Pirimor® pr. 100 liter vann	50 g per behandling per 1000 m ² nettoareal	Bruk 50-200 liter vann per 1000 m ² nettoareal	1-2	7	4

BRUK OG DOSERING

VIRKEOMRÅDE

Pirimor® er tillatt brukt i veksthus mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær.



VIRKEMÅTE

Pirimor® har rask virkning mot bladlus-også mot bladlus som er blitt resistent mot fosformidler-ved kontakt, fordampning og inntrenging i bladene. Pirimor® gir ikke tilfredsstillende virkning mot agurkbladlus.

NYTTEORGANISMER

Pirimor® er godt egnet i integrert plantevern. Pirimor® har liten til middels skadevirkning mot mange nytteorganismer (inkludert pollinatorer), og har relativt kort ettervirkningstid (maks 1 uke). Pirimor® kan derfor benyttes i kombinasjon med biologisk bekjempelse i veksthus.

RESISTENS

Pirimor® tilhører middelgruppen 1A: Karbamater. Resistens mot Pirimor® er vanlig hos ferskenbladlus og agurkbladlus i Norge.

Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder (dersom dette finnes) alltid inngå i bekjempelsesprogrammet.

For å forebygge resistensutvikling er det følgende begrensninger i bruk av Pirimor®:

- Pirimor® skal maksimalt brukes to ganger etter hverandre. De to behandlingene skal utføres innen en periode på 7 dager. Ved behov for ytterligere behandling mot bladlus, skal det brukes et middel fra minst én annen middelgruppe eller nytteedyr før behandling med Pirimor®.
- Pirimor® bør ikke blandes med, eller brukes rett før eller etter behandling med midler i gruppe 1B Organiske fosformidler, pga. fare for kryssresistens.
- Pirimor® bør ikke brukes mot ferskenbladlus og agurkbladlus.

HÅNTERINGSFRIST

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.



FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av polykloropren e.l., øyevern og overtrekksklær ved håndtering og bruk av preparatet.

Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdigt eller avbrytes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Ved uhell eller mistanke omforgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold till bruksrettledningen. Skyll sprøyteutstyr med vann etter bruk, på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutstyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatrestere og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann.

LAGRING

Oppbevares tørt i lukket originalemballasje.



MERK

Vi garanterer at produktet holder rett kvalitet. Dette er ingen garanti for at produktet under alle forhold har den ønskede virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis produktet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre forhold enn angitt på etiketten, bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

Registret varemerke
Pirimor®-Syngenta Group Company

PIRIMOR®

Insektmiddel

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat,
krydderurter og jordbær i veksthus

Sammensetning: Pirimikarb 500 g/kg (50% w/w)
Formulering: vannløselig granulat (WG)
Registreringsnummer: 2011.19.19
Avgiftsklasse: 2
Virkmåte: IRAC gruppe 1A

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen
Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdato

Innehaver av godkjenning:
ADAMA Registrations B.V.
P.O.Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederland
www.adama.com

Tilvirker:
Syngenta Crop
Protection AG
CH-4002 Basel
Sveits


Importør:
Syngenta Nordics A/S
Strandlodsvej 44
2300 København S
Danmark
Tel. +45 32 87 11 00

*ADAMA Celsius B.V., Curacao Branch

10 x 1 KG

ANEPRMNO1KG/03/C1

PIRIMOR®

Productname	Pirimor®		
Country	Norway		
Package size	10 x 1 KG		
Label code	ANEPRMNO1KG/03/C1		
Label dimensions	190 x 330 (hwx)	Name	Saskia de Kruijf
Label date	03/12/2020	Version	01

PIRIMOR®

Insektmiddel

Mot bladlus i tomat, agurk, paprika, salat, krydderurter og jordbær i veksthus



ADAMA

Sammensetning: Pirimikarb 500 g/kg (50% w/w)
Formulering: vannløselig granulert (WG)
Registreringsnummer: 2011.19.19
Avgiftsklasse: 2
Virkmåte: IRAC gruppe 1A

Batchnummer og produksjonsdato: se emballasjen
Holdbarhet: Minimum 2 år fra produksjonsdato

Innehaver av godkjenning: ADAMA Registrations B.V. P.O.Box 355 NL-3830 AK Leusden Nederland www.adama.com	Tilvirker: Syngenta Crop Protection AG CH-4002 Basel Sveits	Importør: Syngenta Nordics A/S Strandlodsvej 44 2300 København S Danmark Tel. +45 32 87 11 00
---	--	---

*ADAMA Celsius B.V., Curacao Branch

10 x 1 KG



FARE

Giftig ved svelging • Gir alvorlig øyeirritasjon • Farlig ved innånding • Mistenkes for å kunne forårsake kreft • Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann • Giftig for bier og andre insekter • Inneholder Pirimikarb. Kan gi en allergisk reaksjon • Unngå innånding av aerosoler • Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet • VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter • Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen • Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.



Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

Les alltid etiketten nøye før bruk



ANEPRMNO1KG/03/C2

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.




UN 2588



Productname	Pirimor®		Name	Saskia de Kruijf
Country	Norway			
Package size	10 x 1 KG			
Label code	ANEPRMNO1KG/03/C2			
Label dimensions	190 x 330 (hwx)	Version	01	
Label date	03/12/2020			



PIRIMOR®




NORWAY



FARE

ANEPRMNO1KG/03/X

ADAMA
Northern Europe B.V.



36 x 10 KG

UN 2588

Productname	Pirimor®		
Country	Norway		
Package size	36 x 10 kg		
Label code	ANEPRMNO1KG/03/X		
Label dimensions	210 x 297 (hwx)	Name	Saskia de Kruijf
Label date	03/12/2020	Version	01