



# DUPLOSAN® SUPER

Mot ugras i eng og beite uten kløver

<b>Sammensetning:</b>	<b>Mekoprop-P (DMA-salt)</b>	<b>130 g/l</b>
	<b>Diklorprop-P (DMA-salt)</b>	<b>310 g/l</b>
	<b>MCPA (DMA-salt)</b>	<b>160 g/l</b>
	<b>Vann, antiskummenidde</b>	<b>447 g/l</b>

## FARE

Farlig ved svelging.

Irriterer huden.

Gir alvorlig øyeskade.

Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Unngå innåndning av aerosoler.

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljø.

### VED KONTAKT MED ØYNE:

Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege

VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

VED SVELGING: Kontakt GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. Skyll munnen.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



## Registreringsinnehaver:

**Nufarm Deutschland GmbH**

Im MediaPark 4e

50670 Köln

Germany

Tel: (+49) 221/179179-0

**REG.NR. 2016.38.21**

® = Registrert varemerke for NUFARM



## Avgiftsklasse 3

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått for 21 dager etter sprøyting.

# 10L

**Nufarm Deutschland GmbH**

Im MediaPark 4e

50670 Köln

Germany

Tel: (+49) 221/179179-0

510007144\_102021

**Nufarm**

Grow a better tomorrow

# Duplosan® Super

Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjente bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

## BRUKSOMRÅDE

Duplosan Super kan brukes til sprøyting mot ugras i eng og beite uten kløver.

Kløver og andre tofrøblada kulturplanter skades.

Må ikke brukes nær veksthus eller ømfintlige kulturer som for eksempel tomat, agurk og kålvekster.

## VIRKEMÅTE

Duplosan Super er et selektivt, systemisk ugrasmiddel. Det tas opp gjennom ugrasets bladverk. Best virkning oppnås i varmt vær når ugraset er i god vekst.

## UGRASVIRKNING

Duplosan Super virker mot mange ugrasarter, både frøugras og rotugras. Ugraset kan grupperes i III grupper avhengig av hvilken dose som er nødvendig for bekjempelse.

Gruppe I	Gruppe II	Gruppe III
Balderbrå Hestehov Meldestokk Gjetertaske Tungras Vassarve Åkerdylle Åkerstemorsblom Åkersvinerot Åkermynte Åkertistel	Høymol Syrerarter Soleiearter Kjempearter Løvetann Følblom Mjørdurt	Hundekjeks Marikåpe Ryllik Stornesle Landøya Dikesvineblom

## BRUKSRETLEDNING

Sprøytetid og dosering:

Kultur	Ugrasarter	Pr. dekar i 15–50 liter vann	Sprøytetid
Godt etablert grasmark uten kløver	Gruppe I	250–300 ml	Når ugraset har 2-4 blad eller dannet store bladrosetter
	Gruppe II	300–400 ml	Når ugraset har dannet store bladrosetter, evt. synlige blomsterknopper om våren eller i haa etter slått eller beiting.
	Gruppe III	400 ml	

Sprøyt i pent, varmt vær når ugraset er i god vekst. Regn de første timene etter sprøyting kan redusere virkningen.

## FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av PVC eller Nitril gummi, vernebriller og heldekkende arbeidstøy ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00

### Håndteringsfrist

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

## RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksretledningen.

Skyll sprøytetstyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir avrenning til vann.

Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytetstyret rengjøres med soda, salmiak eller annet anbefalt vaskemiddel.

## AVFALLSHÅNDTERING

Grundig rengjort tomemballasje leveres med husholdningsavfall eller deponeres på offentlig fyllplass.

Konsentrerte plantevernmiddelester og ikke rengjort tomemballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

## LAGRING

Bør lagres kjølig, men frostfritt. I uåpnet originalemballasje holder Duplosan Super sin virkning i minst 5 år.

## MERK

Det er mange faktorer som kan ha innflytelse på produktets virkning, spesielt steds- eller regionsbetingede faktorer.

Herunder hører for eksempel vær- og jordforhold, kulturplantesorter, vekselbruk, behandlingstidspunkt, anvendt mengde, blanding med andre produkter, forekomst av resistente organismer, sprøyteteknikk og så videre.

Ved spesielt ugunstige forhold kan man ikke utelukke at det kan skje forandringer i produktets virkning eller at det kan oppstå skader på kulturplanter. For slike forhold har ikke produsent eller forhandler noe ansvar.

510007145\_102021