

**Mot ugras i vår- og høstkorn, med eller uten grasgjenlegg til fôr, samt fôrmais. Spitfire 333 HL skader kløver og andre belgvekster.**

**Formulering:** Suspo-emulsjon (SE)

**Sammensetning:** 333 g/L fluroksypyr

**Reg. Nr.:** 2017.7

**Batchnummer og produksjonsdato:** se emballasjen.

**Holdbarhet:** minimum to år fra produksjonsdato.

**Registreringsholder:** Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 København K, Danmark

**Tilvirker:** Dow AgroSciences

**Importør:**

Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm tlf. 03520



# Spitfire™ 333 HL

## UGRASMIDDEL

### Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P261 Unngå innånding av damp/ aerosoler.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



**Behandlingsfrist:** 2 måneder før høstning

**AVGIFTSKLASSE:** 2

™Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

**NETTOINHOLD:** 3 L



01 109 679 32009



Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

### Grunnleggende informasjon og resistens forebygging

Spitfire 333 HL tas i hovedsak opp gjennom bladene. Den har bred ugrasvirkning inkludert klengemaure, då, hønsegras, vindeslirekne, åkerminneblom, vassarve mfl.

Spitfire 333 HL tas opp gjennom bladverket og transporteres til vekstpunktene. Ugraset stopper å vokse og er fullstendig nedvisnet etter 2-3 uker.

Sprøyt ikke en stresset åker. Stress kan forårsakes av faktorer som frost, tørke, drukning/ oksygenmangel, næringsmangel sjukdommer og insektsangrep. Spitfire 333 HL kan untaskvis framkalle gulning av åkeren (forsvinner etter 2-3 uker), dette påvirker ikke avling.

Produkt	Type	Aktivt stoff	HRAC gruppe	Risk for resistens
Spitfire 333 HL	HERBICID	fluroksypyr	0	lav

Spitfire 333 HL tilhører den kjemiske gruppen syntetiske auxinhemmere (HRAC gruppe 0). Resistens mot Spitfire 333 HL er ikke kjent hos ugrasarter i Norge. Ensidig bruk av ett middel, eller en gruppe midler med samme virkningsmekanisme, kan føre til resistens eller nedsatt følsomhet for midlet/middelgruppen. Derfor skal midler fra ulike middelgrupper og/eller alternative bekjempelsesmetoder alltid inngå i bekjempelsesprogrammet. Spitfire 333 HL vil være en resistensbryter til preparater at typen sulfonylurea for bl.a. vassarve.

### Kulturer

Spitfire 333 HL kan brukes alle varianter av vår- og høstkorn, med eller uten grassgjenlegg samt fôrmais. Skader kløver og andre belgvekster.

### Bruksrettledning

**Vårkorn med og uten gjenlegg til fôr:** sprøyt på oppspirt ugras om våren/ forsommer, når kornet har BBCH 13-45. graset bør ha utviklet minst 2 fullt utvikla blad. Bruk 30-40 ml/daa.

**Høstkorn:** sprøyt på oppspirt ugras så snart veksten er kommet godt i gang på våren, når kornet har BBCH 13-45. Bruk 40 ml/daa.

**Fôrmais:** sprøyt på oppspirt ugras når maisen har fra 3 til maks. 6 blader. Senere behandling anbefales ikke. Bruk 30-60 ml/daa.

### Doseringstabell

Kultur	Preparater	Dominerende urgasflora	Dosering pr. dekar
Vårkorn med og uten grasgjenlegg til fôr	Spitfire 333 HL	Klengemaure, då, hønsegras, vindeslirekne, åkerminneblom, vassarve m.fl	24-30 ml med grasgjenlegg 30-40 ml uten grasgjenlegg
Høstkorn om våren, med og uten gjenlegg	Spitfire 333 HL	Klengemaure, då, hønsegras, vindeslirekne, åkerminneblom, vassarve m.fl	40 ml
Fôrmais	Spitfire 333 HL	Klengemaure, då, hønsegras, vindeslirekne, åkerminneblom, vassarve m.fl	30-60 ml

### Blandinger

I fôrmais kan Spitfire 333 HL evt. blandes med andre tillatte midler dersom disse kan blandes med Spitfire 333 HL. Kan blandes med aktuelle skadedyr-, sopp- og CCC-preparater, samt med mikronæringsstoffer.

### JORDTYPER

Spitfire 333 HL kan brukes på alle jordtyper.

### VÆRFORHOLD

Spitfire 333 HL kan brukes fra minst 12°C. Unngå behandling under svært varme eller tørre forhold og før frost. Unngå perioder med lave temperaturer.

### REGNFASTHET

Spitfire 333 HL er regnfast en time etter behandling.

### ETTERFØLGENDE KULTUR

Korn, raps, gras og mais kan brukes som etterfølgende avling.

### MERK!

Det frarås å bruke plantemateriale behandlet med Spitfire 333 HL i veksthus eller til kompost.

## PÅFYLLING

Spitfire 333 HL kan sprøytes ut med konvensjonell åkersprøyte. Preparatet kan fylles på direkt i tanken eller gjennom preparatpåfylleren. Hell i din ønskede mengde av Spitfire 333 HL i halvfull sprøyte med rent vatn, sett på omrøring og hell deretter i ønsket mengde vann. Omrøring skal være på under hele sprøytearbeidet.

## HÅNDBTERINGSFRIST

Anbefalt verneutstyr må nyttes dersom en går inn i behandlet område, eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

## VANNMENGDER

Ved bruk av standard eller såkalt low drift dyse er den anbefalte doseringen 10-30 l vann/daa. Den minste vannmengden skal bare brukes i åpne kulturer med smått ugras. Ved sen behandling når kornet er høyere skal vannmengden økes til 20-30 l /daa. Minste anbefalt trykk er 2-3 bar.

## RENGJØRING

**Merk!** Eventuell skyllevannstank bør være av en størrelse som att sprøytevæskes tynnes ut 5 ganger. Det er spesielt viktig å rengjøre alle innvendige detaljer. Aktiver alle slanger og ventiler samt øk trykket slik at overtrykksventil i det selvrensede filteret løses ut. Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut iht. bruksrettledningen.

Deretter vaskes tanken innvendig med vann tilsatt All Clear<sup>1</sup> Extra. Bruk en vannmengde tilsvarende minst 10 % av tankvolumet. Start omrøring og sprøyt litt gjennom dysene. La resten stå i systemet minst 30 minutter. Start omrøring igjen og sprøyt alt vaskevannet ut gjennom dysene. Gjør dette minst 3-5 ganger. Siler og dyser skal tas ut og rengjøres spesielt godt med 50 ml All Clear Extra /10 liter vann

Skyll sprøytestyret med vann i 5 minutter og sprøy ut gjennom dyser og slanger på et sted som ikke gir fare for forurensing av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med anbefalt vaskemiddel som All Clear Extra.

## AVFALLSHÅNDBTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Andre (flytende):

Rester fortynnes 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettledningen. Rengjort emballasje leveres med husholdningsavfall. Plastemballasje kildesorteres.

## LAGRING

Oppbevares frostfritt i lukket originalemballasjen, men tåler temperatur ned til minus 5°C.

## FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker, ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Corteva Agriscience er medlem i Norsk Plantevern Forening.

<sup>1</sup> Varemærke – FMC Agricultural Solutions

**THIS PAGE HAS BEEN LEFT  
BLANK INTENTIONALLY**

**Mot ugras i vår- og høstkorn, med eller uten grasgjenlegg til fôr, samt fôrmais. Spitfire 333 HL skader kløver og andre belgvekster.**

**Formulering:** Suspo-emulsjon (SE)

**Sammensetning:** 333 g/L fluroksypyr

**Reg. Nr.:** 2017.7

**Batchnummer og produksjonsdato:** se emballasjen.

**Holdbarhet:** minimum to år fra produksjonsdato.

**Registreringsholder:** Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 1, DK-1411 København K, Danmark

**Tilvirker:** Dow AgroSciences

**Importør:**

Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm tlf. 03520



# Spitfire™ 333 HL

## UGRASMIDDEL

### Advarsel

H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

P261 Unngå innånding av damp/ aerosoler.

P302+P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann.

P333+P313 Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P272 Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.

P405 Oppbevares innelåst.

P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



**Behandlingsfrist:** 2 måneder før høstning

**AVGIFTSKLASSE:** 2

™Trademarks of Corteva, DuPont, Dow AgroSciences and Pioneer and affiliated companies or their respective owners.

**NETTOINNHold:** 3 L