



Nettoinnhold:
1 kg e

Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Registrering:
Certis Belchim B.V.
Stadsplateau 16 • 3521 AZ Utrecht • Nederland

® = Reg. varemerke fra
Belchim Crop Protection NV/SA

Granulat

Mot tørråte (*Phytophthora infestans*) i potet.

Sammensetning: Cymoxanil 450 g/kg
Fyllstoffer 550 g/kg

GRUPPE 27 SOPPMIDDEL

Avgiftsklasse: 2
Behandlingsfrist: 7 dager før høsting

Reg. nr.: 2020.2



Nordisk Alkali
GROWING TOGETHER

Nordisk representant:
Nordisk Alkali AB • Malmö, Sverige
Tlf +45 4649 117

cymbal[®] 45



UFI: 4HH8-J045-J00M-VR9X

ADVARSEL

Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
Gir alvorlig øyeirritasjon.
Mistenkes for å kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for å kunne gi fosterskader.
Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårdsplasser og veier.
For å beskytte vannlevende organismer må en vegetert buffersoner på minst 10 meter mot overflatevann overholdes (se Bruksvilkår for å beskytte miljøet).
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann.
Unngå innånding av aerosoler.
Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
Oppbevares innelåst.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).
Uskadliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).

BRUKSANVISNING Bruksområde

Cymbal[®] 45 er tillatt brukt mot tørråte i potet.

Virkemåte

Cymbal[®] 45 inneholder det kontaktvirkende og lokalsystemiske aktivstoff, cymoxanil. Cymbal[®] 45 har ikke tilstrekkelig langtidsvirkning i seg selv, og skal derfor anvendes i blanding med f. eks. Ranman[®] Top. I de første 24 timer etter smittespredning dreper (kurativ virkning) Cymbal[®] 45 soppsporene umiddelbart etter at de har spirt. Cymbal[®] 45 forsterker virkningen mot infeksjoner som nettopp er skjedd (men enda ikke synlig). Cymbal[®] 45 anvendes i et sprøyteprogram i blanding med andre produkter - særlig når smittetrykket er høyt, eller når det planlagte sprøyteintervall ikke kan holdes.

Dosering

25 g/daa i 20-30 l vann. Brukes i blanding med andre midler mot tørråte. Cymbal[®] 45 kan brukes i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter. Maksimalt 6 behandlinger pr. sesong fra potetene er ca. 15 cm høye. Minimum intervall 7 dager.

Værforhold

Sprøyt helst på tørre planter, og når det er utsikt til oppholdsvær noen timer. Cymbal[®] 45 er regnfast etter 2 timer.

Tankblanding

Cymbal[®] 45 skal blandes med f.eks. Ranman[®] Top eller annet virksomt middel for å sikre en bedre forebyggende virkning mot tørråte.

Bruksvilkår for å beskytte miljøet

Vegetert buffersoner (VBS): Den vegeterte buffersonen skal på sprøytetidspunktet ha veletablert plantedekke bestående av gress eller en blanding av gress og urter. Naturlig vegetasjon, inkludert trær og busker, kan også utgjøre hele eller deler av buffersonen, så lenge markvegetasjonen er tett og veletablert.

Unntak fra kravet om vegetert buffersoner:

- Du trenger ikke å ha en vegetert buffersoner mot overflatevann dersom minst ett av de følgende kriteriene er oppfylt:
- Vannet ligger høyere i terrenget enn det området som skal behandles med plantevernmiddel.
- Vannet ligger mer enn 50 m fra det behandlede området.
- Området som skal behandles med plantevernmiddel har mindre enn 2% helling ned mot vannet.

Mer informasjon om vegetert buffersoner finner du i egen veileder på Mattilsynets nettsider.

Resistensrisiko

Cymoxanil tilhører gruppen cyanoacetamideoxime (FRAC gruppe 27) som

vurderes å ha en lav-medium risiko for utvikling av resistens. Det er ikke kjennskap til kryssresistens til andre aktive stoffer. Da Cymbal[®] 45 skal brukes i blanding med andre midler mot tørråte, er risikoen for resistens lav. Bruk av Cymbal[®] 45 i blanding med andre midler vil nedsette risikoen for resistens hos disse.

Tillaging av sprøytevæske

Fyll tanken halvfull med vann, og start omrøring. Fyll opp med ønsket preparatmengde, og deretter den resterende vannmengde. Bruk en godt rengjort sprøyte, og spesielt hvis sprøyta nylig har blitt brukt til andre kulturer enn potet.

Lagring

Oppbevares tørt og frostfritt.

Rengjøring

Tomemballasjen skylles minst 3 ganger med vann, og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes om lag 5 ganger med vann, og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøyteutstyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster.

Forsiktighetsregler

Bruk vernehansker av for eksempel nitril, ansiktsskjerm og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting, og når det er fare for innånding av sprøytetåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 benyttes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

Håndteringsfrist: Vernehansker må nyttes dersom en går inn i behandlet område eller håndterer behandlede plantedeler i en periode på 24 timer etter sprøyting.

Avfallshåndtering

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

Merk

Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har den forventede effekt. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Særlig hvis preparatet brukes på en annen måte, eller under andre forhold enn de som er beskrevet på etiketten, bortfaller vårt ansvar.

Ranman[®] Registrert varemerke for ISK Biosciences Europe N.V.

cymbal[®] 45