

Azuleo[®]

SOPPMIDDEL

GROUP 21 FUNGICIDE

Mot tørråte i potet.

Sammensetning: Cyazofamid 160 g/l
Fyllstoffer 921 g/l

Avgiftsklasse 1

Behandlingsfrist: 7 dager før høsting

Bruksrettlendningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Reg. nr. 2023.12



Registrering:
ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B
B-1831 Diegem, Belgien

® registreret varemærke for Ishihara Sangyo Kaisha, Japan.

™ Trademarks of Corteva and affiliated companies or their respective owners



3 576960 074063 >

NETTO INNHOLD: 5 L e

Azuleo[®]
UFI: 0K5C-79EJ-H09D-
USPQ

Gir alvorlig øyeirritasjon.
Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

VED KONTAKT
MED ØYENENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Unngå innånding av aerosoler.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



ADVARSEL



Importør:

Felleskjøpet Agri, Depotgata 22, 2000 Lillestrøm, tlf. 03520
Norgesfor AS, Mailboxes Etc 367, 0028 Oslo, tlf. 22400700
Fiskå Mølle Moss AS, Havnestredet 6, 1531 Moss, tlf. 69204770

Nordisk representant:

Corteva Agriscience Denmark A/S, Langebrogade 3H, DK-1411 Copenhagen K, www.corteva.dk

21_11030301_09 | 00040-NO | 1497266LbIFrt 2307 -
NORWAY | 7-3118-200-218-11/21

50X20MM MINIMUM
NO TEXT, NO COLOR ON THIS ZONE
(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)

Azuleo®

SOPPMIDDEL

BRUKSOMRÅDE

Azuleo Top er tillatt brukt mot tørråte i potet.

VIKEMÅTE

Azuleo Top er et kontaktvirkende og forebyggende tørråtemiddel. Det hindrer tørråtesoppen i å utvikle seg på de plantedelene hvor sprøytebelegg finnes. For å unngå resistens må Azuleo Top brukes maksimalt 6 ganger pr. vekstsesong, og maksimalt 3 ganger i trekk.

BRUKSRETTLING

Dosering

Bruk 50 ml Azuleo Top pr. dekar. Aktiveringsmiddel er tilsatt produktet.

Sprøyte tid – Behandlingsintervall

Azuleo Top skal brukes forebyggende og senest ved tørråtevarsel og/eller når lokalklimatiske forhold i feltet medfører risiko for tørråtespredning. Under perioder med stort smittepress og/eller stor tilvekst i potetriset bør det sprøytes hver 7. dag. Etter avblomstring og ved lavere smittepress kan sprøyteintervallet økes til hver 10. dag. Azuleo Top brukes maksimalt 3 sprøytinger i trekk. Bruk deretter en behandling med et annet tørråtemiddel. Det anbefales å bruke Azuleo Top i de siste 2–3 sprøytingene mot tørråte, da Azuleo Top reduserer smitten som overføres til knollene.

Vannmengde

Bruk 20 – 40 liter vann pr. dekar. Det er viktig at hele bladmassen dekes med sprøytevæske. Azuleo Top kan brukes både i vanlige åkersprøyter og luftassisterte sprøyter.

Værforbehold

Sprøyt helst på tørre planter, og når det er utsikt til oppholdsvær noen timer. Azuleo Top er regnfast, når sprøytevæska har tørket opp på bladverket.

Tankblandinger

Azuleo Top kan tankblandes med mikronæringsstoffer og pyretroider.

Tillaging av sprøytevæske

1. Fyll sprøytetanken med ca. 50% av den ønskede vannmengde. Start omrøring. Tilsett Azuleo Top.

2. Fyll den resterende vannmengde i tanken sammen med eventuelle blandingspartnere.
3. Tomemballasjen skylles med vann og skyllevannet helles i sprøytetanken. Skyll 3 ganger. Omrøring holdes i gang under sprøyting.

FOREBYGG RESISTENS

Det er viktig å unngå resistens for ethvert middel mot tørråte. For Azuleo Top anbefales følgende regler:

- Bruk alltid Azuleo Top forebyggende.
- Sprøyt maksimalt 3 ganger i trekk med Azuleo Top.
- Azuleo Top må maksimalt brukes 6 ganger pr. år.
- Bruk midler med annen virkemåte.
- Følg anbefalinger om dosering og intervall mellom sprøytingene.

OPPBEVARING

Oppbevares tørt og frostfritt.

FORSIKTIGHETSREGLER

Bruk vernehansker av nitril, vernebriller og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av damp/sprøyteåke, skal halvmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes.

Tilsøtte klær fjernes og vaskes før bruk.

Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes.

Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00

RENGJØRING

Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettlingsledningen.

Skyll sprøytestyr med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurenning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i ømfintlige kulturer må sprøyteutrustning rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

AVFALLSHÅNDTERING

Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

© registrert varemærke for Ishihara Sangyo Kaisha, Japan.

™ Trademarks of Corteva and its affiliated companies.

18_11030302_39 | 1497266LbIBcK/2307 -
NORWAY | 7-3118-200-218-12/19

50X20MM MINIMUM
NO TEXT NO COLOR ON THIS ZONE
(THIS SQUARE MUST BE DELETED BEFORE PRINTING)