

# Tilleggsetikett: Utvidelse for bruksområde av mindre betydning

**Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009, Art.51  
Axial - pinoksaden**

**Godkjent av Mattilsynet: 13.02.2023**

**Gyldig t.o.m. :** ( Se vedtaksbrevet. En utvidelse av godkjenning for bruksområder av mindre betydning følger preparatets ordinære godkjenningsperiode hvis ikke annet er spesifisert i godkjenningsbrevet.)

## **Erklæring**

Brukeren selv står ansvarlig ved eventuelle skader på kulturene og annen utilsiktet effekt som følge av en utvidet anvendelse av mindre betydning.. Unntatt er sprøyteskader som måtte oppstå som følge av at innholdet i preparatet ikke samsvarer med det produsenten har oppgitt på preparatets ordinære etikett.

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for menneske og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

**I tillegg til preparatets ordinære etikett, gjelder betingelsene gitt nedenfor.**

## **Advarsel**

Unngå forurensning av vannmiljøet med produktet eller emballasjen. Ikke rengjør spredeutstyr nær overflatevann. Unngå forurensning via avrenning fra gårds plasser og veier.

For øvrig gjelder godkjenningens betingelsene som framgår av ordinær godkjent etikett.

## **Bruksområde**

Mot markrapp, floghavre og hirser og andre grasugras i gjenlegg og frøeng av bladfaks og gjenlegg av kløverfrøeng.

## **Antall behandlinger:**

1

## **Behandlingsfrist:**

Ingen

## **Bruksrettledning**

### **Dosering:**

#### **Bladfaks:**

70-90 ml/daa.

#### **Gjenlegg kløverfrøeng:**

Mot floghavre og andre grasarter: 70-90 ml/daa.

Mot hirser 60-120 ml/daa.

**Påføring:**

**Bladfaks:**

I gjenlegg: Behandling utføres før 1. september og bladfaksen er minst 15 cm høy.

I frøåret: Behandling utføres når bladfaksen er kommet i god vekst om våren og plantehøyden er ca. 10 cm.

Behandling må utføres i god tid fra vekstregulering.

**Gjenlegg kløverfrøeng:**

Fra 2 bladstadiet til flaggbladet er synlig (BBCH 12-39) på dekkveksten (kornplantene).

Det er fare for resistensutvikling ved ensidig bruk av Axial, følg anvisninger på ordinær etikett.